

Протокол вакцинації Коглавакс для контролю клостридіозів (ковровий спосіб)

Початок вакцинації		
1-ша вакцинація (вересень 2024)	Всі тварини на фермі, крім телят молодше 2х тижневого віку (всі корови, нетелі, молодняк, телиці і телята старше 3 тижнів) Дозування: для тварин вагою менше 100 кг - 2 мл підшкірно, більше 100 кг - 4 мл підшкірно. для тварин з клінічними ознаками клостридіозів - 8 мл підшкірно.	Скласти і зберегти список тварин, які перебувають в день початку вакцинації 2 місяці до отелу і місяць після отелу, а також тварини, які мають клінічні ознаки клостридіозів.
2-га Ревакцинація через 4 тижні (жовтень 2024)	Всі тварини, які брали участь в 1-й вакцинації Дозування: для тварин вагою менше 100 кг - 2 мл підшкірно, більше 100 кг - 4 мл підшкірно. для тварин з клінічними ознаками клостридіозів - 8 мл підшкірно.	
3-тя ревакцинація (додаткова) через 4 тижні від другої ревакцинації (листопад 2024р.)	Вакцинація тих тварин, які були визначені у списку на початку 1-шої вакцинації. (в зв'язку з перебування тварин в технологічно-стресовому періоді, для забезпечення високої імунної відповіді) Дозування - 4 мл підшкірно, для тварин з клінічними ознаками клостридіозів - 8 мл підшкірно.	
Повторна бустерна вакцинація 1 - через 6 місяців після 2-гої ревакцинації (квітень 2025)	Всі тварини старше 9ти місячного віку (корови дійні, сухостійні і нетелі, телиці) Дозування: одноразово підшкірно по 4мл	
В подальшому всі повторні бустерні вакцинації робити з інтервалом в 6-7 місяців	Всі тварини старше 10ти місячного віку (корови дійні, сухостійні і нетелі, телиці) Дозування: одноразово підшкірно по 4мл	

Вакцинація молодняк застосовувати через 1 міс від початку вакцинації, можна в місячному ритмі

2-3 міс. Життя група на 25 гол	Вакцинація Коглавакс (можна поєднувати з іншими вакцинаціями чи обробками, крім живих вакцин) Дозування: 4мл підшкірно
через 4 тижні від початку вакцинації	Ревакцинація Коглавакс Дозування: 4мл підшкірно

