

KETOFEN 10%

Cetoprofeno



USO VETERINÁRIO

Cetoprofeno

Solução Injetável

Bovinos, Equinos e Suínos

O Cetoprofeno é um anti-inflamatório não esteróide (AINE) derivado do ácido fenilpropionico. Como todos os AINEs, possui três propriedades farmacológicas fundamentais: anti-inflamatório, analgésico e antipirético, que atua inibindo a síntese das prostaglandinas e não produz nenhum dos efeitos secundários comuns dos corticosteroides.

FÓRMULA

Cetoprofeno 10,0 g
Excipiente q.s.p. 100,0 mL

INDICAÇÕES

Equinos: tratamento das síndromes inflamatórias e/ou dolorosas do sistema osteoarticular e músculo esquelético em cavalos de esporte e de corridas. Tratamento analgésico e sintomático da Síndrome Cólica.

Bovinos: tratamento anti-inflamatório, antiálgico e antipirético nas artrites, traumatismos, afecções respiratórias, mamites agudas, edemas mamários, distocias e cólicas.

Suínos: tratamento anti-inflamatório, analgésico e antipirético, especialmente em infecções respiratórias e síndrome de mastite, metrite, agalaxia das porcas.

DOSES E MODO DE USAR

Equinos - Via de administração: intramuscular ou intravenosa.
Dose

- Síndromes inflamatórias/dolorosas dos sistemas osteoarticular e músculo-esquelético: 2,2 mg de princípio ativo por kg ou 1 mL para cada 45 kg de peso, durante 3 a 5 dias consecutivos.

- Cólicas: 2,2 mg de princípio ativo por kg ou 1 mL para cada 45 kg de peso. A duração do tratamento deve ser instituída a critério do médico-veterinário. A necessidade de doses suplementares deve ser baseada em novos exames clínicos.

Bovinos - Via de administração: intravenosa ou intramuscular.
Dose: 3 mg de princípio ativo por kg ou 3 mL para 100 kg de peso, durante 1 a 3 dias consecutivos.

Suínos - Via de administração: intramuscular.

Dose: 3 mg de princípio ativo por kg, ou seja, 3 mL por 100 kg de peso.

CONTRAINDICAÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO

- Não administrar por via intra-arterial e em animais com hipersensibilidade ao Cetoprofeno.
- Não administrar em caso de insuficiência renal e hemorragia.

ADVERTÊNCIA, PRECAUÇÕES E PERÍODO DE CARÊNCIA

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS E SUÍNOS:

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS E SUÍNOS TRATADOS.

BOVINOS:

LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

EQUINOS:

ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM ANIMAIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

- Não misturar o produto com outra substância na mesma seringa.
- Não associar com outros anti-inflamatórios não esteróides, nem com diuréticos ou anticoagulantes.
- Na ausência de dados específicos em potro com menos de 15 dias, não administrar durante as primeiras semanas de vida.

MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE, ENTRE 15 °C E 30 °C.

Venda sob prescrição obrigatória e aplicação sob orientação de Médico-Veterinário.

APRESENTAÇÃO

Frasco ampola de vidro contendo 10 mL e 50 mL, acondicionados em caixa individual.

Validade: 36 meses após a data da fabricação.

Licenciado no MAPA sob nº 4654 em 17/05/94.

Responsável Técnica: Dra. Janaína Carlstron

CRMV-SP nº 21.555

Fabricante:

Vetecia Lab. de Produtos Veterinários Ltda.

Rua Dr. Alfredo Ramos, 236 - Jacareí/SP - CEP: 12308-420

CNPJ: 07.685.131/0001-07

Proprietário:

Sespo Indústria e Comércio Ltda.

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale

Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Paulínia/SP.

CEP: 13148-115

CNPJ: 50.464.692/0001-05.

W00016 C-V01



Ceva SAC:

0800-770-0355

sac@ceva.com

