

Pododermatites em Bovinos: Como prevenir?

Doença afeta o bem-estar e produtividade do rebanho e em casos graves, pode levar à claudicação.

A pododermatite em bovinos é um problema de saúde significativo presente com frequência nos rebanhos leiteiros afetando a o bem-estar dos animais e impactando sua produtividade. Esta condição gera desconforto nas vacas e, em casos graves, pode levar à claudicação.

Uma série de fatores podem estar envolvidos no surgimento da doença, entre eles:

Infecções Bacterianas: Bactérias como *Fusobacterium necrophorum* e *Bacteroides spp.* são frequentemente associadas a casos de pododermatite. Esses agentes podem entrar no casco através de pequenos ferimentos ou rachaduras, causando infecções dolorosas.

Trauma Físico: Lesões nos cascos, como cortes, contusões e abrasões, frequentemente ocorrem devido ao manejo inadequado, terrenos irregulares ou impactos diretos. Essas lesões podem facilitar a entrada de patógenos.

Ambiente Inadequado: A umidade excessiva e a exposição prolongada a superfícies ásperas ou abrasivas, como lama ou pedras, podem enfraquecer os cascos dos bovinos, tornando-os mais suscetíveis a infecções.

Nutrição Deficiente: Uma dieta que não fornece os nutrientes essenciais para a saúde dos cascos, como biotina e minerais, pode contribuir para o desenvolvimento de pododermatites.

Nos animais afetados pela doença observa-se diminuição da produção de leite, perda de peso, comprometimento da fertilidade e aumento na taxa de descarte. Além disso é possível notar inchado no casco. Os animais geralmente apresentam claudicação, mancando ou evitando colocar peso no casco afetado, a gravidade da claudicação pode variar de acordo com a extensão da lesão e a presença de infecção.

O quadro de pododermatite pode se agravar rapidamente, por isso é fundamental iniciar o tratamento o quanto antes, considerando a causa subjacente e a gravidade da condição.

O tratamento engloba o uso de antibiótico com número reduzidos de doses para tratar a causa, associado a anti-inflamatório para reduzir a dor e inchaço na região. A Ceva Saúde Animal oferece aos produtores para o combate a pododermatite o TILMICOVET® (Antimicrobiano de dose única e rápido início de ação) e NIGLUMINE

® (Anti-inflamatório não esteroide, indicado para tratamento da inflamação aguda em bovinos).

Os bovinos com a doença devem ser isolados para evitar a propagação da infecção e receber manejo adequado, incluindo cuidados regulares com os cascos. Em casos graves ou crônicos, a cirurgia pode ser necessária para remover tecido danificado ou tratar problemas estruturais nos cascos.