

# BENZOATO HC



## INDUTOR E SINCRONIZADOR DE CIO EM BOVINOS

### USO VETERINÁRIO

#### Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Benzoato de estradiol ..... 0,1 g  
Excipientes q.s.p ..... 100, mL

#### Indicações:

Benzoato HC é uma solução pronta para o uso em bovinos, indicada nos seguintes casos:

- na sincronização da onda de desenvolvimento folicular ou sincronização de cio com dispositivos e implantes de prostágenos ou progesterona;
- na indução da ovulação;
- em protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF);
- na terapia hormonal (retenção de placenta, anestro, metrites, piometrites e mumificação de fetos).

#### Modo de usar e doses:

Benzoato HC é de uso parenteral, administrado exclusivamente por via intramuscular, nas doses de 2 a 3 mL, equivalente a 2 a 3 mg de benzoato de estradiol por fêmea.

A dose e o intervalo entre as doses dependem do programa de reprodução adotado pelo médico-veterinário e da resposta do animal.

Após a primeira perfuração o produto pode ser utilizado por até 30 dias.

#### Precauções:

- O produto não deve ser administrado em fêmeas prenhes a não ser que o objetivo seja o de terminar a gestação ou induzir o parto;
- O estado nutricional e o manejo inadequado dos animais podem levar a resultados insatisfatórios quando da administração do produto;
- Mulheres grávidas e pessoas asmáticas não devem manusear este produto;
- Evitar contato direto com a pele e em caso de derramamento acidental, lavar o local com água corrente;

- Durante o tratamento com o produto, não utilizar outro quimioterápico simultaneamente;
- O tratamento quando realizado sob orientação do médico-veterinário e na posologia recomendada, não deverá produzir reações adversas;
- Não utilizar as embalagens vazias;
- Utilizar seringas e agulhas estéreis para aplicar o produto.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:**

**BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 24 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE - O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.**

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

#### Efeitos adversos:

Não há relatos de contraindicações e limitações de uso para a espécie indicada, quando seguidas corretamente as recomendações e orientações de administração do produto. O comportamento de cio pode ser observado após aplicação. No caso de associação com progesterona isto é comum, já no caso de aplicação após retirada da progesterona isto é desejável.

Doses maiores e prolongadas em vacas podem induzir longos períodos de cio, irritação vaginal e tensão pós-parto com prolapso vaginal. Em vacas gestantes pode produzir aborto.

#### Apresentação:

Cartuchos contendo 1 frasco-ampola de 10 mL ou de 50 mL.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO OBRIGATÓRIA E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.**

Licenciado no MAPA sob o nº 9632 em 07/10/2011.

#### Proprietário e Fabricante:

Ceva Saúde Animal

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale  
Rod. MG 050, Km 18,5, nº 2001 - Distrito Industrial  
Juatuba/MG - CEP: 35675-000  
CNPJ: 07.086.487/0001-16

#### Responsável Técnico:

Gustavo Montaldi Carvalho - CRMV/MG 13.060

