

VIVEDIUM®

USO VETERINÁRIO

TRIPANOCIDA INJETÁVEL PARA BOVINOS,
À BASE DE CLORETO DE ISOMETAMIDIUM



FÓRMULA

Apresentação 1 g:

Cloreto de isometamidium 1,00 g

- Cada frasco de 50 mL de diluente estéril contém:

Água para injetáveis 50 mL

Apresentação 4 g:

Cloreto de isometamidium 4,00 g

- Cada frasco de 200 mL de diluente estéril contém:

Água para injetáveis 200 mL

PROPRIEDADES

Isometamidium, um composto aminofenantridium, possui ação tripanocida utilizada para o tratamento preventivo e curativo da tripanossomíase animal.

A duração do efeito preventivo varia de 8 a 16 semanas, de acordo com o agente causador.

INDICAÇÕES

Para bovinos, nos tratamentos preventivo e curativo da tripanossomíase causada por *Trypanosoma vivax*, *T. evansi*, *T. congolensis* e *T. brucei*.

MODO DE USAR E DOSAGEM

O produto é apresentado na forma de pó, acompanhado por uma embalagem de diluente estéril para preparar a solução, a qual deve ser utilizada imediatamente após o seu preparo.

Administrar a solução preparada através da via intramuscular, na região do pescoço.

Tratamento preventivo:

A dose recomendada é 1 mg/kg em áreas de infecção endêmica. A ação preventiva do VIVEDIUM pode ser aumentada se os animais receberem tratamento curativo, no mínimo 2 semanas antes, com produtos à base de diminazeno.

Na dose de 1 ml/20 kg (solução a 2%), VIVEDIUM pode proporcionar de 8 a 16 semanas de controle, conforme a incidência dos vetores.

Tratamento curativo:

A dose recomendada é 0,5 mg/kg. Animais tratados preventivamente com VIVEDIUM que desenvolvem forma clínica de tripanossomíase podem ser tratados com produtos à base de diminazeno, com o objetivo de evitar o desenvolvimento de cepas resistentes.

TRATAMENTOS - VIVEDIUM

Peso (kg)	PREVENTIVO	CURATIVO
	1,0 mg/kg	0,5 mg/kg
50	2,50 mL	1,25 mL
100	5,00 mL	2,50 mL
150	7,50 mL	3,75 mL
200	10,00 mL	5,00 mL
250	12,50 mL	6,25 mL
300	15,00 mL	7,50 mL
350	17,50 mL (dividir em 2 injeções)	8,75 mL
400	20,00 mL (dividir em 2 injeções)	10,00 mL
450	22,50 mL (dividir em 2 injeções)	11,25 mL
500	25,00 mL (dividir em 2 injeções)	12,25 mL

CONTRAINDICAÇÃO

O produto não deve ser administrado em animais sensíveis ao isometamidium.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não aplicar VIVEDIUM e outro tripanocida ao mesmo tempo.

PRECAUÇÕES

Não injetar por via subcutânea. Não injetar mais que 15 mL por ponto de aplicação. No caso de grandes volumes, dividir a dose total em dois ou mais pontos de aplicação, mantendo-se distância entre os locais de injeção.

APRESENTAÇÃO

Frascos contendo 1 g de pó (acompanhado de frasco com 50 mL de diluente estéril) e 4 g de pó (acompanhado de frasco com 200 mL de diluente estéril).

VALIDADE

02 (dois) anos após a data de fabricação.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 46 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C. Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no MAPA sob nº SP 000128-0.000001 em 07/03/2016

Responsável Técnico: Dr. Cassio Murin - CRMV/SP: 6.473

Proprietário e fabricante: Ceva Santé Animale - Zone Industrielle Très le Bois - 22600 Loudéac – França

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

Sespo Indústria e Comércio Ltda.

Rua Manoel Joaquim Filho, 303, Santa Terezinha, Paulínia, SP - CEP 13148-115

CNPJ: 50.464.692/0001-05



CEVA SAC:

0800-770-0355

sac@ceva.com

PRODUTO IMPORTADO

NOT VIVEDIUM BRESIL	VIVEDIUM BRESIL
200x160/FP 35,5X160	
RECTO/VERSO	ID60769
CODE ARTICLE : 57332-02	
Black	CORPS : 8 pts

HELENE 14/03/19