



FLOW PACK CEFAVET

REAÇÕES ADVERSAS

Não há relatos de reações adversas nos tratamentos com cefalosporinas e glicocorticoides pela via intramamária. Caso detecte algum efeito colateral grave ou outros efeitos não mencionados nesta bula, informe imediatamente ao Médico-Veterinário.

APRESENTAÇÃO:

Caixas contendo 30 seringas descartáveis com 10 mL.

PRAZO DE VALIDADE

Dois (02) anos após a data de fabricação do produto.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. Janaina Carlstron - CRMV-SP 21.555.

Licenciado no MAPA sob nº SP 000129-0.000003 em 21/09/1992.

PROPRIETÁRIO

SESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Paulínia/SP
CEP: 13148-115
CNPJ: 50.464.692/0001-05

FABRICANTE

VETECIA LAB. DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA EPP

Rua Dr. Alfredo Ramos, 236 - Centro - Jacareí/SP
CNPJ: 07.685.131/0001-07

PART.:

FABR.:

VENC.:



USO VETERINÁRIO

PERÍODO DE CARÊNCIA

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 1 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 84 HORAS (3,5 DIAS) APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE SACO BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE, ENTRE 15 °C E 30 °C.



CEVA SAC:
0800-770-0355
sac@ceva.com

FÓRMULA

Cada seringa de 10 mL contém:

Cefoperazona sódica* 250,0 mg
Acetato de Prednisolona 4,0 mg
Excipientes q.s.p. 10,0 mL

* Equivalente a 233,149 mg de cefoperazona base

DESCRIÇÃO

CEFAVET é uma suspensão oleosa para uso intramamário, a base de cefoperazona sódica e acetato de prednisolona. A cefoperazona sódica é uma cefalosporina semissintética de 3ª geração, pertencente à classe dos antibióticos β-lactâmicos. Não é tóxica ou irritante e, após administração via intramamária, persiste no úbere por 48 horas em concentrações adequadas, para um tratamento tópico efetivo da mastite. Por outro lado, o acetato de prednisolona é um anti-inflamatório esteroide, que reduz o inchaço e a dor no local e tem como principal objetivo

facilitar a ação do antibiótico, proporcionando um rápido retorno dos animais à produção.

INDICAÇÕES

CEFAVET é indicado para o tratamento de mastite clínica em vacas lactantes causada pelos microorganismos sensíveis *Truoperella pyogenes*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* e *Streptococcus agalactiae*.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Aplicar o conteúdo total de uma seringa de CEFAVET em cada teto acometido por mastite clínica, pela via intramamária, que corresponde a 250 mg de cefoperazona sódica e 4 mg de acetato de prednisolona por quarto mamário. A aplicação deve ser realizada após a ordenha completa do animal e desinfecção do local. Em seguida, massagear suavemente, de baixo para cima, para a completa distribuição do medicamento na glândula mamária. Se após 48 horas da primeira aplicação não houver a cura do processo, poderá ser aplicada mais uma seringa em cada teto.

PRECAUÇÕES GERAIS

- Obedecer às dosagens e recomendações de uso do produto;
- Não utilizar o produto em animais sensíveis ao(s) princípio(s) ativo(s) da fórmula;
- Não utilizar em outras espécies animais;
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto;
- Usar luvas durante o manuseio para evitar o contato com a pele;
- Lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário;
- Em caso de contato acidental com a pele, olhos e boca, lavar abundantemente com água;
- Em caso de ingestão acidental, procurar auxílio médico imediatamente;
- Não armazenar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica;
- Não reutilizar as embalagens vazias e descartá-las conforme legislação vigente, para evitar a contaminação do meio ambiente.