

USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS:
ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 74 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.



COMBO

POUR ON

Carrapaticida, mosquicida e bernicida para bovinos

Conteúdo:

5 L



P50316 V103

USO VETERINÁRIO



Carrapaticida, mosquicida e bernicida para bovinos

COMBO

POUR ON

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:
Cipermetrina 5,0 g
Clorpirifós 7,0 g
Butóxido de piperonila 1,0 mL
Excipiente q.s.p. 100,0 mL

INDICAÇÕES:

COMBO POUR ON é indicado para o uso tópico (pour on), no combate aos seguintes ectoparasitas que acometem os bovinos:
Carrapatos do gênero *Rhipicephalus* (*Boophilus microplus* (adultos e imaturos)).
Larvas de *Dermatobia hominis* (berne).
Moscas dos gêneros *Haematobia irritans* (adultos) e *Dermatobia hominis* (adultos).

FORMA DE APLICAÇÃO E DOSAGEM:

COMBO POUR ON é uma solução oleosa pronta para uso que deve ser aplicada em toda a linha dorsal do animal, vertendo a dose separada no frasco dosador, do pescoço até a anca do animal.

A dosagem recomendada é de 10 mL para cada 100 Kg de peso vivo, obedecendo à tabela:

Peso corporal (Kg)	Volume do produto (mL)
Até 100 kg	10 mL
> 100 - 200 kg	20 mL
> 200 - 300 kg	30 mL
> 300 - 400 kg	40 mL
> 400 - 500 kg	50 mL
> 500 kg	60 mL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dr. Cássio R. Murin - CRMV/SP 6473

PROPRIETÁRIO:

Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, nº 303, Santa Terezinha
Paulínia/SP - CEP: 13148-115
CNPJ: 50.464.692/0001-05

INTERVALO ENTRE DOSES:

O intervalo entre as aplicações varia de acordo com o programa adotado no controle dos ectoparasitas, condições ambientais, nível de infestação e taxa de reinfestação do rebanho e a critério do médico-veterinário.
É recomendada a realização de carrapaticidograma, para avaliar a resistência dos carrapatos ao medicamento.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

Não aplicar em animais recém-nascidos, debilitados, exaustos, estressados ou doentes.
Não administrar em animais com a pele lesionada.
Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida aos princípios ativos do produto.
Não aplicar o produto nas horas de calor intenso.
Não tratar os animais quando há ameaça de chuva. No caso de chover dentro das 24 horas após o tratamento, recomenda-se repetir o tratamento.
Não aplicar em fêmeas no terço final de gestação.
Dosagem máxima recomendada para bovinos acima de 600 kg é de 60 mL via pour on.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

A utilização do produto simultaneamente a outros medicamentos à base de organofosforados e carbamatos, deve ser avaliada e observada atentamente pelo médico-veterinário, para prevenir a ocorrência de intoxicações.
Produtos que ativam os receptores colinérgicos e relaxantes musculares periféricos devem ser evitados quando se fizer uso de organofosforados. Os tranquilizantes fenotiazínicos aumentam a toxicidade dos organofosforados.
A succinilcolina e outros agentes bloqueadores neuromusculares podem potencializar os efeitos nicotínicos dos organofosforados.

PRECAUÇÕES:

Mantiver a embalagem fechada.
Obedecer às dosagens e recomendações para o

uso do produto.

Produto tóxico para peixes, pássaros e abelhas.
Evitar longo contato com a pele, mucosa e a inalação do produto.
Lavar as mãos após o manuseio do produto e não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.
Não guardar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.
Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto.
Utilizar equipamentos de proteção individual (luvas, macacão, óculos de proteção, gorro e máscara contra gases tóxicos) no momento da aplicação do produto.
Não reutilizar as embalagens vazias.
Não contaminar rios e outros cursos de água.
Caso o produto entre em contato com os olhos lavá-los imediatamente com água abundante, durante 15 minutos.
Caso ocorra intoxicação acidental proceder da seguinte forma: retirar as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas do corpo com água e sabão. Em casos de ingestão acidental não provocar o vômito e não oferecer leite, gorduras ou óleos ao paciente. Procurar imediatamente atendimento médico, levando consigo o rótulo do produto.
Não diluir o produto em óleos.

REAÇÕES ADVERSAS:

Na posologia indicada e sob orientação do médico-veterinário não devem ocorrer intoxicações nas espécies para qual o produto é indicado.
Os piretróides possuem potente atividade inseticida com baixa toxicidade em mamíferos, geralmente são seguros, mas em caso de intoxicação acidental podem causar alergia, náusea, vômito e dor de cabeça.
Os organofosforados, em caso de intoxicação

acidental, podem provocar, principalmente, os seguintes efeitos tóxicos: letargia, anorexia, diarreia, polaciúria, vômitos, salivação e tremores musculares.

INFORMAÇÕES PARA O USO MÉDICO:

Evitar o contato do produto com a pele e mucosas do corpo humano. No caso de contatos acidentais, lavar as partes atingidas várias vezes com água e sabão.
Em casos de intoxicação humana, procurar um médico levando consigo a embalagem do produto. Cipermetrina: não existe antídoto específico. O tratamento deve ser sintomático.
Clorpirifós: sulfato de atropina e reativadores da colinesterase (contração ou PAM).
Butóxido de piperonila: não existe antídoto específico. O tratamento deve ser sintomático.

PRAZO DE VALIDADE:

02 (dois) anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÕES:

Frasco plástico dosador de 1 litro e bombona plástica de 5 litros.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e a temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

Após aberto, utilizar em até 180 dias.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado pelo MAPA desde 19/01/2012 e registrado sob número SP 000129-0.000040.

Para partida, fabricação e vencimento: **VIDE FRASCO.**

FABRICANTE:

Ipanema Ind. Prod. Veterinários Ltda.
Rod. Raposo Tavares, km 113 - Barreiro
Araçoiaba da Serra/SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52



CUIDADO VENENO

CEVA SAC:
0800-770-0355
sac@ceva.com



P12163 V01