

#### PRECAUÇÕES:

- Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto.
- A segurança do produto não foi avaliada em fêmeas prenhes.
- Pulverizar vacas leiteiras somente depois da ordenha.
- Lavar o úbere das vacas antes da próxima ordenha.
- Utilizar pulverizadores (manuais ou motorizados), em bom estado de conservação, com boa pressão e previamente bem lavados, caso tenham sido utilizados com outro tipo de inseticida.
- Aplicar sobre os animais em lugar aberto, bem ventilado, sempre a favor do vento.
- Não pulverizar sobre rações animais ou alimentos armazenados.
- Produto tóxico para peixes.
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.
- A higiene é fundamental, lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário.
- Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica.
- Não reutilizar as embalagens vazias, estas devem ser destruídas de acordo com a legislação vigente.
- A utilização do produto simultaneamente a outros medicamentos à base de organofosforados e carbamatos deve ser avaliada e observada atentamente pelo médico veterinário, para prevenir a ocorrência de intoxicações.
- Agitar novamente a emulsão caso esta fique em repouso por mais de 20 minutos.

#### Primeiros socorros:

Em caso de intoxicação acidental, procurar imediatamente o médico. Não provocar vômito e não oferecer leite, gorduras ou óleos ao paciente. Em caso de contato com os olhos: lavar com água corrente durante 15 minutos. Em caso de contato com a pele: retirar as roupas contaminadas e lavar as áreas atingidas com água e sabão. A cipermetrina não possui antídoto específico, o tratamento da intoxicação é sintomático, podendo incluir lavagem gástrica e a administração de antídotos da clorpirrifos, sulfato de atropina e reativadores da colinesterase.

**APRESENTAÇÃO:** Frascos de plástico de 25 mL e 250 mL e 1 L.

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO APÓS ABERTURA:** 6 meses.

**PRAZO DE VALIDADE:** 02 anos após a data de fabricação.

#### Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C.

Licenciado no MAPA sob n.º 000 129-50.000005 em 13/06/2018

Responsável Técnico: Dr. Cassio R. Murin – CRMV/SP 6.473

#### Proprietário:

SESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale  
Rua Manoel Joaquim Filho, 303  
CEP: 13148-115 – Paulínia - SP  
CNPJ: 50.464.692/0001-05

#### Fabricante:

IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.  
Rodovia Raposo Tavares, km 113 - Barreiro  
Araçoiaba da Serra – SP  
CNPJ: 64.687.015/0001-52  
Indústria Brasileira

P10881 V14

**CEVA SAC:**  
0800-770-0355  
sac@ceva.com



**Contém:**  
1 Frasco com  
1 Litro



**CONCENTRADO EMUSIONÁVEL CARRAPATICIDA,  
MOSQUICIDA E BERNICIDA PARA USO TÓPICO EM BOVINOS**

## USO VETERINÁRIO

**Contém BPO**  
Potencializador de Cipermetrina

**ATENÇÃO - PERÍODO DE CARÊNCIA: BOVINOS: ABATE - 8 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE - 2 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE CARÊNCIA,  
CONSULTE A BULA DO PRODUTO.**



#### FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

CIPERMETRINA .....	15,00 g
CLORPIRIFOS .....	25,00 g
BUTOXÍDIO DE PIPERONILA .....	15,00 g
VEÍCULO q.s.p. ....	100,00 mL

#### PERÍODO DE CARÊNCIA:

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:**

##### BOVINOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 8 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO 2 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO, O LEITE DEVE SER DESCARTADO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**INDICAÇÕES: CYPERCLOR® PLUS PULVERIZAÇÃO** é indicado para o tratamento das infestações causadas por carrapatos (*Rhipicephalus Boophilus microplus*), moscas dos chifres (*Haematobia irritans*) e bernes (*Dermatobia hominis*) bovinos. O produto pode ser utilizado em bezerras a partir de 4 meses de idade.

#### MODO DE USAR E POSOLOGIA:

##### Posologia:

**CYPERCLOR PLUS PULVERIZAÇÃO** deve ser diluído na proporção de 1 (uma) parte do produto para 800 partes de água, ou seja, diluir 1 litro do produto para 800 litros de água.

A tabela abaixo mostra o esquema de diluição do produto:

CYPERCLOR PLUS PULVERIZAÇÃO	ÁGUA
25 mL	20 litros
250 mL	200 litros
1 L	800 litros

#### Modo de Usar:

**CYPERCLOR PLUS PULVERIZAÇÃO** deve ser pulverizado por todo o corpo do animal, principalmente, orelhas, base dos chifres, barbelas, axilas, entre os membros, virilha e inserção da cauda. Deve-se usar 4 a 5 litros do preparado por animal.

**INTERVALOS ENTRE DOSES:** O intervalo entre aplicações irá depender do grau de infestação dos animais, do manejo estratégico adotado pelo Médico Veterinário da propriedade e da época do ano.

#### CONTRA INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

##### Contra Indicações:

- Não utilizar o produto em animais sensíveis aos princípios ativos.
- Não utilizar o produto nos animais em horário de sol a pino.
- Não utilizar o produto em dias de chuvas.
- Não utilizar o produto fora da indicação de bula.
- Animais fracos, doentes ou com problemas hepáticos são mais sensíveis à possibilidade de intoxicação.
- Este produto é contraindicado para bubalinos

##### Limitações de Uso:

- Alguns animais podem apresentar sensibilidade ao produto como: meneios de cabeça e cauda, agitação e diminuição do apetite, porém esses sintomas tendem a desaparecer após 24 horas da aplicação do produto.
- Em casos mais severos de sensibilidade o animal pode apresentar reações cutâneas devido ao uso incorreto do produto, como por exemplo, a não distribuição homogênea do produto no animal ou sobredose.

