



BULA DEXACORT

DIMENSIONAL

100 x 155 mm

CORES

PANTONE BLACK C

P50410 V302

ÚLTIMA
ALTERAÇÃO

06/11/2025

DEXACORT



USO VETERINÁRIO

ANTI-INFLAMATÓRIO, ANTIFLOGÍSTICO E ANTIALÉRGICO À BASE DE DEXAMETASONA

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Dexametasona (fosfato de sódio) 250 mg
Excipiente q.s.p. 100 mL

Propriedades:

O produto é uma solução aquosa de dexametasona fosfato de sódio em um veículo estável, tamponado e estéril. A dexametasona pertence a uma série de corticosteroides dotados de atividade anti-inflamatória muito poderosa, que em doses terapêuticas, não se acompanha de retenção hidrossódica nem acarreta agrave.

Indicações:

Tratamento das inflamações localizadas nas articulações e estruturas acessórias, antiflogístico e antialérgico.

Nota: desaconselhável o emprego em hipertensão, tuberculose, diabetes e insuficiência cardíaca congestiva. Nas infecções graves, só aplicar quando acompanhado pelo tratamento

anti-infeccioso adequado.

Farmacodinâmica - Resumo:

A dexametasona difunde-se através das membranas celulares e forma complexos com os receptores citoplasmáticos específicos. Estes complexos penetram no núcleo da célula, unem-se ao DNA e estimula a transcrição do mRNA e posterior síntese de enzimas, que são as responsáveis por dois tipos de efeitos dos corticosteroides sistêmicos. E estes agentes podem suprimir a transcrição do mRNA em algumas células (por ex.: linfócitos). Como anti-inflamatório esteroide, inibe a acumulação de células inflamatórias, incluindo o macrófago e leucócitos, na zona de inflamação. Inibe a fagocitose, a liberação de enzimas lisossômicas e a síntese ou liberação de alguns mediadores químicos da inflamação. Como imunossupressor, reduz a concentração de linfócitos dependentes do timo, monócitos e eosinófilos. Diminui a união das imunoglobulinas aos receptores celulares da superfície e inibe a síntese ou liberação de interleucinas, e reduz a importância da resposta imune primária. Estimula o catabolismo proteico e induz o metabolismo dos aminoácidos. Aumenta a disponibilidade de glicose.

Posologia:

Equinos e bovinos (adultos): 2 a 4 mL
Potros e bezerros: 1 a 2 mL

Nas aplicações intra-articulares e periarticulares, aplicar as doses menores.

Cabe ao médico-veterinário determinar a posologia recomendada em cada caso e, nos tratamentos prolongados, ordenar uma dose de manutenção, fração da terapêutica.

Modo de usar:

Aplicar em injeções intramusculares, intra-articulares e periarticulares.

Período de carência:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA BOVINOS:
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 08 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO. EQUINOS: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS DESTINADOS AO ABATE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Apresentações:

Frascos de 10 mL, 20 mL e 50 mL.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais doméstico. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado pelo MAPA desde 07/07/1988. Registrado sob o número MG 000022-0.000031.

Proprietário e Fabricante:

Ceva Saúde Animal Ltda.
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rod. MG 050, Km 18,5 nº 2001
Distrito Industrial - Juatuba/MG
CEP: 35675-000
CNPJ: 07.086.487/0001-16

Responsável Técnico:

Gustavo Montaldi Carvalho
CRMV/MG 13.060



P50410 V302 - 100 X 155 MM

Aprovação | MARKETING

Aprovação | REGULATÓRIOS

Aprovação | GQ JUATUBA

Aprovação | EMBALAGEM

Período de carência:

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTE PERÍODOS DE
CARÊNCIA BOVINOS:**

**ABATE: O ABATE DOS
ANIMAIS TRATADOS COM
ESTE PRODUTO SOMENTE
DEVE SER REALIZADO 08 DIAS
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: ESTE PRODUTO NÃO
DEVE SER APLICADO EM
FÊMEAS PRODUTORAS DE
LEITE PARA O CONSUMO
HUMANO.**

**EQUINOS: ESTE PRODUTO
NÃO DEVE SER APLICADO EM
EQUINOS DESTINADOS AO
ABATE PARA O CONSUMO
HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE
CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA
DOS LIMITES APROVADOS,
TORNANDO O ALIMENTO DE
ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO
PARA O CONSUMO.**

Apresentações:

Frascos de 10 mL, 20 mL e 50 mL.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais doméstico. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E
APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO
DO MÉDICO-VETERINÁRIO.**

Licenciado pelo MAPA desde 07/07/1988. Registrado sob o número MG 000022-0.000031.

Proprietário e Fabricante:

Ceva Saúde Animal Ltda.

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale

Rod. MG 050, Km 18,5 nº 2001

Distrito Industrial - Juatuba/MG

CEP: 35675-000

CNPJ: 07.086.487/0001-16

Responsável Técnico:

Gustavo Montaldi Carvalho

CRMV/MG 13.060



DEXACORT



USO VETERINÁRIO

ANTI-INFLAMATÓRIO, ANTIFLOGÍSTICO E ANTIALÉRGICO À BASE DE DEXAMETASONA

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Dexametasona (fosfato de sódio) 250 mg

Excipiente q.s.p. 100 mL

Propriedades:

O produto é uma solução aquosa de dexametasona fosfato de sódio em um veículo estável, tamponado e estéril.

A dexametasona pertence a uma série de corticosteroides dotados de atividade anti-inflamatória muito poderosa, que em doses terapêuticas, não se acompanha de retenção hidrossódica nem acarreta agrave.

Indicações:

Tratamento das inflamações localizadas nas articulações e estruturas acessórias, antiflogístico e antialérgico.

Nota: desaconselhável o emprego em hipertensão, tuberculose, diabetes e insuficiência cardíaca congestiva. Nas infecções graves, só aplicar quando acompanhado pelo tratamento

anti-infeccioso adequado.

Farmacodinâmica - Resumo:

A dexametasona difunde-se através das membranas celulares e forma complexos com os receptores citoplasmáticos específicos. Estes complexos penetram no núcleo da célula, unem-se ao DNA e estimula a transcrição do mRNA e posterior síntese de enzimas, que são as responsáveis por dois tipos de efeitos dos corticosteroides sistêmicos. E estes agentes podem suprimir a transcrição do mRNA em algumas células (por ex.: linfócitos). Como anti-inflamatório esteroide, inibe a acumulação de células inflamatórias, incluindo o macrófago e leucócitos, na zona de inflamação. Inibe a fagocitose, a liberação de enzimas lisossômicas e a síntese ou liberação de alguns mediadores químicos da inflamação. Como imunossupressor, reduz a concentração de linfócitos dependentes do timo, monócitos e eosinófilos. Diminui a união das imunoglobulinas aos receptores celulares da superfície e inibe a síntese ou liberação de interleucinas, e reduz a importância da resposta imune primária. Estimula o catabolismo proteico e induz o metabolismo dos aminoácidos. Aumenta a disponibilidade de glicose.

Posologia:

Equinos e bovinos (adultos): 2 a 4 mL

Potros e bezerros: 1 a 2 mL.

Nas aplicações intra-articulares e periarticulares, aplicar as doses menores.

Cabe ao médico-veterinário determinar a posologia recomendada em cada caso e, nos tratamentos prolongados, ordenar uma dose de manutenção, fração da terapêutica.

Modo de usar:

Aplicar em injeções intramusculares, intra-articulares e periarticulares.

Período de carência:

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTE PERÍODOS DE
CARÊNCIA BOVINOS:**

**ABATE: O ABATE DOS
ANIMAIS TRATADOS COM
ESTE PRODUTO SOMENTE
DEVE SER REALIZADO 08 DIAS
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: ESTE PRODUTO NÃO
DEVE SER APLICADO EM
FÊMEAS PRODUTORAS DE
LEITE PARA O CONSUMO
HUMANO.**

**EQUINOS: ESTE PRODUTO
NÃO DEVE SER APLICADO EM
EQUINOS DESTINADOS AO
ABATE PARA O CONSUMO
HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE
CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA
DOS LIMITES APROVADOS,
TORNANDO O ALIMENTO DE
ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO
PARA O CONSUMO.**

Apresentações:

Frascos de 10 mL, 20 mL e 50 mL.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais doméstico. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E
APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO
DO MÉDICO-VETERINÁRIO.**

Licenciado pelo MAPA desde 07/07/1988. Registrado sob o número MG 000022-0.000031.

Proprietário e Fabricante:

Ceva Saúde Animal Ltda.

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale

Rod. MG 050, Km 18,5 nº 2001

Distrito Industrial - Juatuba/MG

CEP: 35675-000

CNPJ: 07.086.487/0001-16

Responsável Técnico:

Gustavo Montaldi Carvalho

CRMV/MG 13.060

