

EQUIPALAZONE

INJETÁVEL



USO VETERINÁRIO

ANTI-INFLAMATÓRIO

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Fenilbutazona 20,00 g
Excipiente q.s.p. 100,00 mL

○ **Equipalazone** solução injetável, à base de fenilbutazona, é um fármaco anti-inflamatório não esteróide (AINE) pertencente à classe do ácido enólico, do subgrupo das pirazolonas, que apresenta destacadas propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórias, para ser administrado por via intravenosa em equinos.

○ **Equipalazone** demonstra possuir três ações principais dos fármacos anti-inflamatórios não esteróides, as quais se devem basicamente a inibição da enzima ciclooxigenase 2 (COX-2) em células inflamatórias, que converte o ácido araquidônico nos endoperoxídeos cíclicos PGG2 e PGH2 e a consequente redução da síntese de prostaglandinas.

Assim sendo, uma potente ação anti-inflamatória é resultado da diminuição dos mediadores vasodilatadores PGE2 e PGI2, que significa menor vasodilatação e, indiretamente, menos edema, sem que haja, entretanto, interferência no acúmulo de células inflamatórias.

Um importante **efeito analgésico** é notado como consequência da menor geração de prostaglandinas, que significa menos sensibilização

de terminações nervosas receptiva aos mediadores inflamatórios bradicinina e 5-hidroxitriptamina.

E finalmente, um destacado **efeito antipirético** é observado graças à diminuição do mediador prostaglandínico, que é produzido em resposta ao pirógeno inflamatório interleucina 1, responsável pela elevação do ponto de ajuste hipotalâmico para o controle da temperatura corporal.

Indicações:

Para tratamento de inflamações das articulações e afecções reumáticas, articulares e musculares.

USO PROIBIDO EM ANIMAIS PRODUTORES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO.

Contraindicações:

Deve-se evitar o uso do produto em animais com histórico de doenças hepáticas, cardiovasculares, renais, úlceras gastrintestinais, hipersensibilidade aos derivados pirazolônicos e em animais com distúrbios hematológicos.

Doses e modo de usar:

Equinos: 1 a 2 mL (2,2 a 4,4 mg/kg) para cada 100 kg de peso vivo, exclusivamente por via intravenosa lenta, a cada 24 ou 48 horas.

Não exceder a dose diária de 4 g para equinos.

As doses poderão ser modificadas conforme a gravidade do caso e a critério do médico-veterinário.

Precauções:

Utilizar exclusivamente a via intravenosa, pois a fenilbutazona pode causar irritação no local após a administração intramuscular. Injetar lentamente por via intravenosa na razão de 10 mL a cada 30 segundos.

Interações medicamentosas: existem riscos potenciais de interações medicamentosas quando se combina fenilbutazona com outros anti-inflamatórios não esteróides.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E

APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado pelo MAPA desde 21/06/1988.
Registrado sob o número MG 000022-0.000019.

Proprietário e Fabricante:

Ceva Saúde Animal Ltda
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rod. MG 050, Km 18,5, nº 2001 - Distrito Industrial
Juatuba/MG - CEP: 35675-000
CNPJ: 07.086.487/0001-16

Responsável Técnico:

Gustavo Montaldi Carvalho
CRMV/MG 13.060



P50411 V303