CARTUCHO FLURON GOLD 2 L

310 mm

FÓRMULA
Cada 100 mL contém:
Cipermetrina técnica ..... 5,00 g
Clorpirifós técnico ..... 7,00 g
Fluazuron ..... 2,50 g
Butóxido de piperonila ..... 5,00 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

INDICAÇÕES
FLURON® GOLD POUR-ON é um ectoparasiticida para aplicação tópica (pour on), à base de cipermetrina 5%, clorpirifós 7%, fluazuron 2,5% e butóxido de piperonila, indicado para o tratamento e controle dos principais ectoparasitas de bovinos, a saber:
- Carrapato (*Riphicephalus microplus*);
- Berne (*Dermatobia hominis*);
- Mosca dos chifres (*Haematobia irritans*).

POSOLOGIA E MODO DE USAR
Posologia:
FLURON® GOLD POUR ON deve ser aplicado na dose de 1 mL para cada 10 kg de peso vivo, garantindo que cada animal receba a dose de 5 mg/kg de cipermetrina, 7 mg/kg de clorpirifós, 2,5 mg/kg de fluazuron e 5 mg/kg de butóxido de piperonila.

A tabela abaixo mostra o esquema de dosificação do produto:

Peso do animal	Dose do FLURON® GOLD POUR ON
100 kg	10 mL
150 kg	15 mL
200 kg	20 mL
250 kg	25 mL
300 kg	30 mL
350 kg	35 mL
400 kg	40 mL
450 kg	45 mL
500 kg	50 mL

Obs.: Animais com mais de 500 kg, utilizar a posologia de 1 mL para cada 10 kg de peso vivo.

Modo de Usar:
FLURON® GOLD POUR ON deve ser aplicado por via tópica, em todo dorso do animal (fio do lombo) de forma homogênea, desde o pescoço até a cauda.

INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES
Estudos realizados com o produto demonstram que a eficácia carrapaticida se mantém por até 60 dias e a eficácia mosquicida se mantém por até 24 dias após o tratamento.

PERÍODO DE CARÊNCIA

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS **SOMENTE** DEVE SER REALIZADO **91 DIAS APÓS** A APLICAÇÃO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM BOVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO
Contraindicações:
Não utilizar o produto em animais produtores de leite para o consumo humano.
Não utilizar o produto em vacas prenhas.
Não utilizar o produto em animais jovens.
Não utilizar o produto em animais sensíveis aos princípios ativos.
Não utilizar o produto nos animais nos horários mais quentes do dia.
Não utilizar o produto em dias de chuvas.
Não utilizar o produto fora das indicações do cartucho-bula.

Limitações de Uso:
Não utilizar o produto em animais fracos, doentes ou com problemas hepáticos.
Alguns animais podem apresentar sensibilidade ao produto como: balançar de cabeça e cauda, agitação e diminuição do apetite, porém esses sintomas tendem a desaparecer após 24 horas da aplicação do produto.
Em casos mais severos de sensibilidade o animal pode apresentar reações cutâneas, devido ao uso incorreto do produto, como por exemplo, a não distribuição homogênea do produto ao longo do dorso do animal ou sobredose.

PRECAUÇÕES GERAIS
- Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto.
- Não ingerir.
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.
- A higiene é fundamental, lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário.
- Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Em caso de contato com pele e olhos: remover as vestes contaminadas e lavar com água corrente em abundância por 15 minutos. Persistindo a irritação consultar um médico levando consigo a bula do produto.

Em caso de ingestão: não provocar vomito e não administrar catártico se a vítima estiver com diarreia. Consultar um médico levando consigo a bula do produto.

Instruções para o médico: medicação de apoio conforme os sintomas e sua intensidade. Antídoto específico: sulfato de atropina - 1 a 6 mg a cada 30 minutos, até leve atropinização (nunca administre sulfato de atropina antes do aparecimento dos sintomas de intoxicação).

APRESENTAÇÃO
Frasco plástico de 1 L e 2 L.

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO APÓS ABERTURA
6 meses.

PRAZO DE VALIDADE
2 anos após a data de fabricação.

Venda sob prescrição do médico-veterinário

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

Cuidado Veneno

Proprietário
Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Paulínia/SP
CEP: 13148-115 — CNPJ: 50.464.692/0001-05

Fabricante:
IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.
Rodovia Raposo Tavares, km 113 – Barreiro
Araçoiaba da Serra/SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52
Indústria Brasileira

Licenciado pelo MAPA desde 18/12/2012.
Registrado sob o número SP 000129-0.000030.

Responsável Técnica: Dra. Janaína Carlstron CRMV-SP 21.555

CARRAPATICIDA, MOSQUICIDA E BERNICIDA POUR ON PARA BOVINOS.

Fluron® GOLD pour on

PART.:

FABR.:

VENC.:

CARRAPATICIDA, MOSQUICIDA E BERNICIDA POUR ON PARA BOVINOS.

EXCLUSIVA FORMULAÇÃO INOVADORA

Fluron® GOLD pour on

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS **SOMENTE** DEVE SER REALIZADO **91 DIAS APÓS** A APLICAÇÃO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM BOVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Contém 1 frasco de 2 litros
USO VETERINÁRIO

CARRAPATICIDA, MOSQUICIDA E BERNICIDA POUR ON PARA BOVINOS.

Fluron® GOLD pour on

P11974 V03

7 898043 434547