

Fertcor 5000 U.I.



USO VETERINÁRIO

GONADOTRFINA CORIÔNICA HUMANA (hCG)

Fórmula:

Cada frasco de liofilizado contém:	
Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG)	5000 U.I.
Excipientes q.s.p.	20,00 mg
Cada frasco de diluente contém:	
Cloreto de sódio	18,00 mg
Excipientes q.s.p.	2,00 mL

FERTCOR 5000 UI é uma preparação estéril e liofilizada de gonadotrofina coriônica humana, elaborada pela placenta nos primeiros meses de gestação, durante a qual sua eliminação se dá por via urinária. O hCG é coletado da urina de mulheres grávidas mediante técnica de extração, purificação e padronização, que consiste em obtê-lo a um elevado grau de pureza, tendo a preparação injetável uma ótima tolerabilidade, seja local ou geral. A gonadotrofina coriônica humana desenvolve na fêmea uma ação prevalentemente luteinizante, favorecendo a ovulação, o desenvolvimento e a manutenção do corpo lúteo. Nos machos, a gonadotrofina coriônica humana estimula as células intersticiais do testículo à produção de andrógenos, favorecendo deste modo a evolução das características sexuais.

Espécies animais: equinos, bovinos, suínos, ovinos e caprinos.

Indicações:

Fêmeas: para induzir a ovulação, no caso de estro prolongado ou cio silencioso ou associado ao FSH para indução do estro. Para induzir a luteinização do foliculo e manutenção do corpo lúteo, no caso de subfertilidade devido à função luteínica insuficiente e no caso de cisto ovariano, associado ou não à ninfomania.

Machos: no caso de produção insuficiente de testosterona por parte do testículo, com consequente diminuição da libido; nos casos de criptorquidismo.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS: ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS. LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS.

SUÍNOS E EQUINOS: ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Posologia:

Fêmeas:

Éguas: indução da ovulação, em casos de estro prolongado: 1500 U.I. (0,6 mL) a 3000 U.I. (1,2 mL). Repetir eventualmente o tratamento após 24 horas, se necessária. Anestro: associando-se a um tratamento anterior com FSH: 2000 U.I. (0,8 mL) a 3000 U.I. (1,2 mL). Repetir, se necessário, após 24 horas.

Vacas: indução da ovulação nos casos de falta ou atraso da ovulação: 1000 U.I. (0,4 mL) a 3000 U.I. (1,2 mL). Repetir após 24 horas, se necessário. Tratamento de cisto folicular; (mais ou menos) associado ou não à ninfomania: 5000 U.I. (2 mL) a 10000 U.I. (4 mL) em uma única administração ou em 2 doses, repetidas após 12 horas. Hipofertilidade devido à função luteínica insuficiente: 1000 U.I. (0,4 mL) a 1500 U.I. (0,6 mL) no dia seguinte à fecundação.

Porcas: indução da ovulação no caso de anestro: 100 U.I. (0,04 mL) a 500 U.I. (0,2 mL) com tratamento prévio com FSH.

Ovelhas e cabras: indução da ovulação em caso de anestro: 100 U.I. (0,04 mL) a 500 U.I. (0,2 mL) com tratamento prévio com FSH.

Machos:

Garanhões: no caso de criptorquidismo inguinal: 1500 U.I. (0,6 mL) a 5000 U.I. (2 mL) duas vezes por semana, por 4 a 6 semanas. Estímulo da produção de testosterona, no caso de diminuição da libido: 1500 U.I. (0,6 mL) 2 vezes por semana, durante 4 a 6 semanas.

Suínos, carneiros e bodes: estímulo da produção de testosterona, nos casos de diminuição da libido: 500 U.I. (0,2 mL). Repetir o tratamento 2 vezes por semana durante 4 a 6 semanas.

Touros: nos casos de criptorquidismo inguinal: 1500 U.I. (0,6 mL) a 5000 U.I. (2 mL). O tratamento deve ser repetido 2 vezes por semana, por 4 a 6 semanas. Estímulo da produção de testosterona, no caso de diminuição da libido: 1500 U.I. (0,6 mL). Repetir o tratamento 2 vezes por semana durante 4 a 6 semanas.

Alterações na posologia a critério do médico-veterinário.

Via de administração:

Injetável, por via intramuscular ou endovenosa (muito lentamente).

Apresentação:

Cartucho contendo 2 frascos com liofilizado, acompanhados de 2 frascos com diluente.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

Licenciado no MAPA sob nº 4460 em 26/10/1993.

Responsável Técnico:

Dr. Cassio R. Murin - CRMV-SP 6.473

Proprietário:

Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Uma empresa do Grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Santa Terezinha
Paulínia/SP - CEP: 13148-115
CNPJ: 50.464.692/0001-05

Fabricante:

Fabiani Saúde Animal Ltda.
Rua Centro Africana, 219 - Várzea de Baixo
São Paulo/SP - CEP: 04730-050
CNPJ: 15.741.848/0001-49

