

Fluron[®]
GOLD pour on



FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
Cipermetrina técnica 5,00 g
Clorpirifós técnico 7,00 g
Fluzaron 2,50 g
Butóxido de piperonila 5,00 g
Veículo q.s.p. 100 mL

INDICAÇÕES

FLURON[®] GOLD POUR ON é um ectoparasiticida para aplicação tópica (pour on), à base de cipermetrina 5%, clorpirifós 7%, fluzaron 2,5% e butóxido de piperonila, indicado para o tratamento e controle dos principais ectoparasitas de bovinos, a saber:

- Carrapato (*Rhipicephalus microplus*);
- Bem-me (Dermatobia hominis);
- Mosca dos chifres (*Haematobia irritans*).

POSOLOGIA E MODO DE USAR

FLURON[®] GOLD POUR ON deve ser aplicado na dose de 1 mL para cada 10 kg de peso vivo, garantindo que cada animal receba a dose de 5 mg/kg de cipermetrina, 7 mg/kg de clorpirifós, 2,5 mg/kg de fluzaron e 5 mg/kg de butóxido de piperonila.

A tabela abaixo mostra o esquema de dosificação do produto:

Peso do animal	Dose do FLURON [®] GOLD POUR ON
100 kg	10 mL
150 kg	15 mL
200 kg	20 mL
250 kg	25 mL
300 kg	30 mL
350 kg	35 mL
400 kg	40 mL
450 kg	45 mL
500 kg	50 mL

Obs.: Animais com mais de 500 kg, utilizar a posologia de 1 mL para cada 10 kg de peso vivo.

Modo de Usar

FLURON[®] GOLD POUR ON deve ser aplicado por via tópica, em todo dorso do animal (fo do lombo) de forma homogênea, desde o pescoço até a cauda.

INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES

Estudos realizados com o produto demonstram que a eficácia carrapaticida se mantém por até 60 dias e a eficácia mosquicida se mantém por até 24 dias após o tratamento.

PERÍODO DE CARÊNCIA

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA: BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 91 DIAS APÓS A APLICAÇÃO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM BOVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

Contraindicações:
Não utilizar o produto em animais produtores de leite para o consumo humano.
Não utilizar o produto em vacas prenhas.
Não utilizar o produto em animais jovens.
Não utilizar o produto em animais sensíveis aos princípios ativos.
Não utilizar o produto nos animais nos horários mais quente do dia.
Não utilizar o produto em dias de chuva.
Não utilizar o produto fora das indicações do cartucho-bula.

Limitações de Uso:

Não utilizar o produto em animais fracos, doentes ou com problemas hepáticos.
Alguns animais podem apresentar sensibilidade ao produto como: balançar de cabeça e cauda, agitação e diminuição do apetite, porém esses sintomas tendem a desaparecer após 24 horas da aplicação do produto.
Em casos mais severos de sensibilidade o animal pode apresentar reações cutâneas, devido ao uso incorreto do produto, como por exemplo, a não distribuição homogênea do produto ao longo do dorso do animal ou sobredose.

PRECAUÇÕES GERAIS

- Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto.
- Não ingerir.
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.
- A higiene é fundamental, lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário.
- Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Em caso de contato com pele e olhos: remover as vestes contaminadas e lavar com água corrente em abundância por 15 minutos. Persistindo a irritação consultar um médico levando consigo a bula do produto.

Em caso de ingestão, não provocar vômito e não administrar catártico se a vítima estiver com diarreia. Consultar um médico levando consigo a bula do produto.

Instruções para o médico: medicação de apoio conforme os sintomas e sua intensidade. Antídoto específico: sulfato de atropina - 1 a 6 mg a cada 30 minutos, até leve atropinização (nunca administrar sulfato de atropina antes do aparecimento dos sintomas de intoxicação).

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico de 1 L e 2 L.

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO APÓS ABERTURA

6 meses.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos após a data de fabricação.

Venda sob prescrição do médico-veterinário

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e a temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

Cuidado Veneno

Proprietário
SEPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303
CEP: 13148-115 - Paulínia/SP
CNPJ: 50.464.692/0001-05

Fabricante:
IPRÊNIA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.
Rodovia Raposo Tavares, km 113 - Barreiro
Araçoiaba da Serra/SP
CNPJ: 66.687.015/0001-52
Indústria Brasileira

Licenciado pelo MAPA desde 18/12/2012.

Registrado sob o número SP 000129-0.000030.

Responsável Técnico: Dr. Cássio Renato Murin CRMV-SP 6.473



**CARRAPATICIDA,
MOSQUICIDA E
BERNICIDA POUR ON
PARA BOVINOS.**

Fluron[®]
GOLD pour on

PART.:

FABR.:

VENC.:

**CARRAPATICIDA, MOSQUICIDA
E BERNICIDA POUR ON
PARA BOVINOS.**

EXCLUSIVA
FORMULAÇÃO
NOVADORA



**CARRAPATICIDA,
MOSQUICIDA E
BERNICIDA POUR ON
PARA BOVINOS.**

Fluron[®]
GOLD pour on

Fluron[®]
GOLD pour on

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA: BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 91 DIAS APÓS A APLICAÇÃO.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM BOVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.



**Contém 1 frasco de 2 litros
USO VETERINÁRIO**

