

VACINA CONTRA O

GARROTILO

USO VETERINÁRIO

Conservar entre 2 °C e 8 °C
Agite antes de usar

Conteúdo: 20 mL



P50185 V301



Composição: Suspensão de *Streptococcus equi* em soro fisiológico, inativada pelo formol.

Indicação: Prevenção do garrotilho (adenite infecciosa) dos equinos.

Via de administração e modo de usar: Deve ser administrada por via intramuscular, na região glútea, após assepsia local. Animais sadios não vacinados previamente devem receber três doses de 2 mL da vacina, intervaladas de 2 a 4 semanas. A revacinação com uma dose deve ser realizada anualmente.

Importante: A vacina não é recomendada para animais em período de incubação, nem para tratamento de doença. Usar todo o conteúdo no momento em que o frasco for aberto. No caso de reações anafiláticas, aplicar adrenalina.

Apresentações: Frascos contendo 20

mL (10 doses).

Licenciado no MAPA sob nº 2683 em 23/03/1987.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Proprietário e Fabricante:

Ceva Saúde Animal

Uma empresa do grupo

Ceva Santé Animale

Rod. MG 050, Km 18, 5, nº 2001

Distrito Industrial - Juatuba/MG

CEP: 35675-000

CNPJ: 07.086.487/0001-16

Responsável Técnico:

Gustavo Montaldi Carvalho

CRMV/MG 13.060

SAC: 0800-770-0355

sac@ceva.com

Para partida, fabricação e vencimento:

VIDE FRASCO.