

INDIGEST



USO VETERINÁRIO

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Membutona sob forma de sal dietanolamina (equiv. a 100 mg de base) 10,2 g
Excipientes q.s.p. 100,0 mL

Indicações principais:

Bovinos, equinos, suíños, caprinos e ovinos. Para aumentar as secreções biliares e pancreáticas.

Indicações complementares:

Graças ao aumento destas secreções, Indigest poderá ser usado para tratamento de disfunções do trato gastrointestinal, tais como: constipação, diarréia, gastroenterites, insuficiência hepática, estresse hepatopancreático dos animais jovens em regime de engorda intensiva e timpanismo.

Posologia:

Bovinos adultos: 20 mL a 40 mL

Bezerros: 5 mL a 15 mL

Equinos: 20 mL a 30 mL

Suíños: 1 mL/10 Kg de peso

Ovinos e caprinos: 5 mL a 10 mL

Modo de usar:

A via de administração mais prática é a intramuscular, sendo que a via intravenosa deve ser usada quando se pretende uma ação terapêutica rápida. Em equinos, o produto deve ser administrado por via intravenosa lentamente na jugular (cerca de 20 mL em 20 segundos).

Duração do tratamento:

Injeção única, podendo ser repetida após 24 horas a critério do médico-veterinário.

Interações medicamentosas:

Indigest não pode ser associado a soluções de cálcio e penicilina procaína injetáveis, mas pode vir a ser associado a preparações de diidroestreptomicina e vitamina A.

Contraindicações:

Não usar em animais com hipertermia.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 48 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 48 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

SUÍNOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 48 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

EQUINOS:

O PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS DESTINADOS AO ABATE PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Efeitos secundários:

Devido à alta concentração do Indigest, podem ocorrer os seguintes efeitos secundários no caso de aplicação inadequada:

- Uma injeção intravenosa rápida pode provocar um estado semelhante ao choque com hipertensão. O animal "cai de joelhos" mas normalmente levanta-se após alguns minutos. Portanto, lembre-se sempre: injeção intravenosa lenta.
- Quando se injetam grandes volumes (mais de 20 mL) num mesmo local, haverá atração de líquido tecidual circulante, acarretando risco de

necrose. Quando se utiliza injeção intramuscular, a dose a ser aplicada não deve exceder 20 mL.

- A injeção de **Indigest** provoca, em muitos casos, o aumento da motilidade do estômago, micção e eliminação de excrementos (fezes) de coloração escura, ricos em sais biliares.

Sobredosagem:

As doses indicadas de **Indigest** não devem ser aumentadas. Nos casos acidentais de superdosagem, administrar tónicos cardíacos.

Apresentação:

Frasco-ampola de vidro contendo 30 mL.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado no MAPA sob nº 5649 em 02/10/1996.

Proprietário e Fabricante:

Ceva Saúde Animal

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rod. MG 050, nº 2001 - Distrito Industrial
Juatuba/MG - CEP: 35675-000
CNPJ: 07.086.487/0001-16

Responsável Técnico:

Gustavo Montaldi Carvalho
CRMV/MG 13.060

