

NIGLUMINE



USO VETERINÁRIO

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Flunixin meglumina 8,29 g (*)

Excipiente q.s.p. 100,0 mL

* Equivalente a 5 g de flunixin

Indicações:

Para bovinos: no tratamento da inflamação aguda.

Para equinos: no tratamento de dores viscerais associadas à cólica. No tratamento de inflamações e dores associadas com alterações musculoesqueléticas.

Niglumine é recomendado naqueles casos em que esteja contraindicada uma terapia com corticosteroides.

Posologia e modo de usar:

Niglumine deve ser administrados a bovinos e equinos por via intramuscular ou intravenosa.

Bovinos: 1 mL para cada 22,5 Kg de peso por via intramuscular ou intravenosa. Repetir se for necessário, com intervalos de 24 horas, porém por não mais que 5 dias consecutivos.

Equinos: em dores viscerais associadas à cólicas, recomenda-se 1 mL para cada 45 Kg de peso via intramuscular ou intravenosa, ao início dos sintomas. O tratamento pode ser repetido 1 ou 2 vezes se reaparecerem os sintomas. Em inflamações e dores associadas em alterações musculoesqueléticas, recomenda-se 1 mL para cada 45 Kg de peso, via intramuscular ou intravenosa, uma vez ao dia durante não mais que 5 dias consecutivos.

Contraindicações:

Não administrar a animais com menos de 3 dias de idade. Não administrar a animais com histórico de hipersensibilidade à flunixin.

Precauções:

Não exceder a dose recomendada. Não misturar outras substâncias na mesma seringa. Evitar a injeção intra-arterial a equinos, já que estes reagem com ataxia, incoordenação, hiperventilação, histeria e debilidade muscular. Deverão ser tomadas precauções na administração a bezerros e, caso ocorram sintomas de desidratação, deverá ser feito tratamento de fluidoterapia. Não utilizar durante a gestação.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 20 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 1 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

EQUINOS: ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS DESTINADOS AO ABATE PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Interações medicamentosas:

Não são conhecidas, portanto os pacientes que requeiram uma terapia conjunta com outros fármacos devem ser monitorados para detectar possíveis interações.

Advertências:

Não administrar em cavalos de corrida durante os 8 dias que antecedem uma competição. A causa da inflamação, da dor ou da cólica deve ser determinada e tratada paralelamente com terapia adequada.

Restrição de uso:

Não administrar a equinos cuja carne seja destinada ao consumo humano.

Apresentações:

Frascos de vidro contendo 10 mL, 25 mL, 50 mL ou 100 mL.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO OBRIGATÓRIA E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO- VETERINÁRIO.

Licenciado no MAPA sob nº 6.670 em 11/01/1999.

Proprietário e Fabricante:

Ceva Saúde Animal

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale

Rod. MG 050, nº 2001 – Distrito Industrial

Juatuba/MG – CEP: 35675-000

CNPJ: 07.086.487/0001-16

Responsável Técnico:

Gustavo Montaldi Carvalho

CRMV/MG 13.060



P50409 V301