



CARTUCHO PADOCK GEL



PART:
FABR.:
VENÇ.:

Ivermectina PADOCK Gel

VERMÍFUGO À BASE DE IVERMECTINA,
PARA USO ORAL EM EQUINOS



Uso Veterinário

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
EQUÍDEOS: *Equus caballus* / Cavalos
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM ANIMAIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.



Contém: uma seringa com 6g

Ivermectina
PADOCK
Gel



F-1102

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO. MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE, ENTRE 15 °C E 30 °C.

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE
Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Paulínia/SP
CEP: 13148-115 — CNPJ: 50.464.692/0001-05

Responsável Técnica
Dra. Janaina Carlstron - CRMV/SP 21.555

Licenciado pelo MAPA desde 01/08/1998.
Registrado sob o número SP 000129-0.000022

Ivermectina PADOCK Gel

FÓRMULA
Cada 100 g contém:
Ivermectina 2,00 g
Excipiente q.s.p. 100,00 g

INDICAÇÕES
PADOCK GEL é um vermífugo oral indicado para o combate e controle das verminoses que acometem os equinos.
Agentes etiológicos susceptíveis:
Pequenos Estrogilídeos: *Cyathostomum spp* (*Cyathostomum catinatum*), *Cylicocyclus spp* (*Cylicocyclus leptostomum*, *Cylicocyclus ultrajectinus*) e *Cylicostephanus spp* (*Cylicostephanus longibursatus*)
Nematódeos: *Parascaris equorum*

POSOLOGIA
PADOCK GEL deve ser administrado em dose única, na dose equivalente a 0,2 mg de ivermectina por kg de peso. Essa posologia é facilmente conseguida mediante o ajuste do êmbolo da seringa, de acordo com o peso do animal.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR
PADOCK GEL deve ser administrado diretamente por via oral, utilizando a seringa que acondiciona o produto. Após o ajuste do êmbolo de acordo com o peso do animal, introduzir o bico da seringa na boca do animal e administrar o produto sobre a língua, sempre em direção ao fundo da boca. O uso de **PADOCK GEL** não altera a rotina do animal, não havendo necessidade de jejum prévio e/ou qualquer modificação na dieta. No entanto, recomenda-se não dar água de beber ao animal logo após a administração do produto.

PRECAUÇÕES
PADOCK GEL não apresenta efeitos colaterais ou secundários nas doses indicadas, podendo, portanto, ser administrado em equídeos de todas as idades, fêmeas gestantes e potros em lactação.
PADOCK GEL não afeta a fertilidade dos machos, podendo ser usado em garanhões, mesmo na época da cobertura.
O produto **PADOCK GEL** não deve ser utilizado em fêmeas prenhes e ou lactantes.

APRESENTAÇÃO
Seringas plásticas descartáveis com êmbolo graduado, contendo 6 g de produto.

EMBAGRAF
26

CEVA SAC:
0800-770-0355
sac@ceva.com



P10083 V15

