



CARTUCHO PADOCK PLUS NF



PART.:
FABR.:
VENC.:

Ivermectina + Praziquantel

PADOCK PLUS NF

Vermífugo oral de largo espectro para equídeos



Uso Veterinário

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
EQUÍDEOS: *Equus caballus* / Cavalos
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM ANIMAIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.



Contém: uma seringa com 6g

Ivermectina + Praziquantel
PADOCK PLUS NF

EMBALAGRAF
(11) 2484-6736

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO. MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 °C E 30 °C.

Responsável Técnico: Dra. Janaina Carlstron - CRMV-SP 21.555
Licenciado pelo MAPA desde 09/10/2003.
Registrado sob o número SP 000129-0.000038.

Proprietário e Fabricante:
Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - CEP: 13148-115
Paulínia - SP - CNPJ: 50.464.692/0001-05

CEVA SAC:
0800-770-0355
sac@ceva.com



P10082 V16

Ivermectina + Praziquantel

PADOCK PLUS NF

FÓRMULA: Cada 100 g contém:
Ivermectina (B1a)..... 2,00 g
Praziquantel..... 25,00 g
Excipiente q.s.p..... 100,00 g

DESCRIÇÃO: PADOCK PLUS NF é um vermífugo oral de amplo espectro desenvolvido para uso em equídeos. A associação de ivermectina e praziquantel tem ação muito eficaz no tratamento e controle de endoparasitoses que afetam os equídeos, incluindo as causadas por tênias.

INDICAÇÕES: PADOCK PLUS NF é indicado no tratamento e controle das verminoses que acometem os equinos, asininos e muare, a saber: Vermes gastrintestinais;

Grandes estrongilídeos;
Strongylus vulgaris (Formas adultas e estágios arteriais); *Strongylus edentatus* (Formas adultas e estágios tissulares); *Strongylus equinus* (Formas adultas); *Triodontophorus spp.* (Formas adultas).

Pequenos estrongilídeos:
Cyathostomum spp. (Formas adultas e larvas de 4º estágio); *Cylicocyclus spp.* (Formas adultas e larvas de 4º estágio); *Cylicostephanus spp.* (Formas adultas e larvas de 4º estágio); *Cylicodontophorus spp.* (Formas adultas e larvas de 4º estágio); *Gyaloccephalus capitatus*.

Outros vermes redondos:
Habronema muscae; *Trichostrongylus axei*; *Strongyloides westeri*; *Oxyuris equi* (Formas adultas e imaturas); *Parascaris equorum* (Formas adultas, formas imaturas (L4) e formas migratórias (L3)); *Onchocerca sp.* (Microfilárias)

Vermes pulmonares: *Dictyocaulus arnfield* (Formas adultas e larvas de 4º estágio)

Gasterófilos: *Gasterophilus spp.* (Estágios orais e gástricos)

Dermatoses causadas por larvas cutâneas (Feridas de verão):

Habronema spp.; *Draschia spp.*

Cestódeos (Tênias):

Anoplocephala perfoliata;

Anoplocephala magna;

Paranoplocephala mamillana

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR: PADOCK PLUS NF deve ser administrado diretamente por via oral, utilizando a seringa que acondiciona o produto. Após o ajuste do êmbolo de acordo com o peso do animal, introduzir o bico da seringa em sua boca e administrar o produto sobre a língua. O uso de PADOCK PLUS NF não altera a rotina do animal, não havendo necessidade de jejum prévio e/ou qualquer modificação na dieta, no entanto, recomenda-se não dar água para o animal beber logo após a administração do produto.

POSOLOGIA: PADOCK PLUS NF deve ser administrado, em dose única, na dose equivalente a 0,2 mg de Ivermectina por kg de peso corporal e de 2,5 mg de Praziquantel por kg de peso corporal. Esta posologia corresponde a 1 (um) grama do produto para cada 100 kg de peso corporal.

TABELA ORIENTATIVA DE DOSES:

Peso corporal	Dose
Até 100 kg	1,0 g
Até 200 kg	2,0 g
Até 300 kg	3,0 g
Até 400 kg	4,0 g
Até 500 kg	5,0 g
Até 600 kg	6,0 g

Obs: Cada seringa de 6 g é suficiente para tratar 600 kg de peso corporal.

CONTRAINDICAÇÕES: Não usar em equídeos destinados ao consumo humano. Não utilizar em animais que apresentem comprometimento da barreira hemato-encefálica.

LIMITAÇÕES DE USO: Utilizar com cautela quando os animais estiverem em tratamento com agentes que deprimem o sistema nervoso central.

PRECAUÇÕES GERAIS: Uso exclusivo em equídeos. Obedecer as dosagens e recomendações para uso do produto. Não exercitar o animal antes da aplicação. Não fumar ou alimentar se durante o manuseio do produto

A higiene é fundamental; sempre lavar as mãos antes e depois de manusear qualquer produto veterinário. Não utilize e nem guarde perto de bebidas, alimentos, outros medicamentos e produtos de higiene. Não reutilizar a embalagem vazia. Não contaminar rios, lagos ou outros mananciais, com a embalagem do produto, pois o mesmo é tóxico para peixes e outros organismos aquáticos.

APRESENTAÇÕES: Seringas descartáveis de plástico com êmbolo graduado contendo 6 g (apresentação individual) e 30 g (apresentação multidose).

F-1102