

PART.:  
FABR.:  
VENÇ.:

# PADOCK

## Gel

Ivermectina

Vermífugo oral de largo  
espectro para equídeos



## Uso Veterinário

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:  
EQUÍDEOS: *Equus caballus* / Cavalos  
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM ANIMAIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.



Contém: uma seringa com 6g

Ivermectina

PADOCK  
Gel

3

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO. MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15°C E 30°C.

Responsável Técnico: Dr. Cassio R. Murin - CRMV-SP 6.473  
Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6490 em 11/08/98

Proprietário e Fabricante:  
Sespo Indústria e Comércio Ltda.  
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale  
Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - CEP: 13148-115  
Paulínia - SP - CNPJ: 50.464.692/0001-05

CEVA SAC:  
0800-770-0355  
sac@ceva.com



P10083 V13

# PADOCK

## Gel

Ivermectina

### FÓRMULA

Cada 100g contém:

Ivermectina ..... 2,00 g  
Excipiente q.s.p. .... 100,00 g

### INDICAÇÕES

PADOCK GEL é indicado para o combate e controle das seguintes verminoses que acometem os equinos, asininos e muares:  
Vermes gastrintestinais:

Grandes estrongilídeos: *Strongylus vulgaris* (formas adultas e estágios arteriais); *Strongylus edentatus* (formas adultas e estágios tissulares); *Strongylus equinus* (formas adultas); *Triodontophorus* (formas adultas).  
Pequenos estrongilídeos: *Cyathostomum spp.* (formas adultas e larvas de 4º estágio); *Cylicocyclus spp.* (formas adultas e larvas de 4º estágio); *Cylicostephanus spp.* (formas adultas e larvas de 4º estágio); *Cylicodontophorus spp.* (formas adultas e larvas de 4º estágio); *Gyalocephalus spp.* (formas adultas e larvas de 4º estágio).  
Outros vermes redondos: *Habronema muscae*; *Trichostrongylus axei*; *Strongyloides westeri*; *Oxyuris equi* (formas adultas e imaturas); *Parascaris equorum* [formas adultas e imaturas (L4) e formas migratórias (L3)]; *Onchocerca sp.* (Microfilárias).  
Vermes pulmonares: *Dictyocaulus arnfieldi* (formas adultas e larvas de 4º estágio).  
Gasterófilos: *Gasterophilus spp.* (Estágios orais e gástricos).

Dermatoses causadas por larvas cutâneas (feridas de verão): *Habronema spp.*; *Draschia spp.*

### VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

PADOCK GEL deve ser administrado diretamente por via oral, utilizando a seringa que acondiciona o produto. Após o ajuste do êmbolo de acordo com o peso do cavalo, introduzir o bico da seringa na boca do animal e administrar o produto sobre a língua, sempre em direção ao fundo da boca. O uso de PADOCK GEL não altera a rotina do animal, não havendo necessidade de jejum prévio e/ou qualquer modificação na dieta. No entanto, recomenda-se não dar água de beber ao animal logo após a administração do produto.

### POSOLOGIA

PADOCK GEL deve ser administrado em dose única, na dose equivalente a 0,2 mg de Ivermectina por kg de peso. Essa posologia é facilmente conseguida mediante o ajuste do êmbolo da seringa, de acordo com o peso do animal.

### EFEITOS COLATERAIS OU SECUNDÁRIOS

PADOCK GEL não apresenta efeitos colaterais ou secundários nas doses indicadas, podendo, portanto, ser administrado em equídeos de todas as idades, fêmeas gestantes e potros em lactação.  
PADOCK GEL não afeta a fertilidade dos machos, podendo ser usado em garanhões, mesmo na época da cobertura.

### APRESENTAÇÃO

Seringas plásticas descartáveis com êmbolo graduado, contendo 6g de produto.