

PART.:  
FABR.:  
VENÇ.:

Ivermectina + Praziquantel

# PADOCK PLUS NF

Vermífugo oral de largo espectro para equídeos



## Uso Veterinário

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARENÇA:  
EQUÍDEOS: *Equus caballus* / Cavalos  
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM ANIMAIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.



Contém: uma seringa com 6g

Ivermectina + Praziquantel  
**PADOCK PLUS NF**

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO. MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15°C e 30°C.

Responsável Técnico: Dr. Cassio R. Murin - CRMV-SP 6.473  
Licenciado no MAPA sob nº 8716 em 09/10/2003

Proprietário e Fabricante:  
Sespo Indústria e Comércio Ltda.  
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale  
Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - CEP: 13148-115  
Paulínia - SP - CNPJ: 50.464.692/0001-05

**CEVA SAC:**  
0800-770-0355  
sac@ceva.com



P10062 V13

Ivermectina + Praziquantel

# PADOCK PLUS NF

**FÓRMULA:** Cada 100 g contém:

Ivermectina (B1a).....	2,00 g
Praziquantel.....	25,00 g
Excipiente q.s.p.....	100,00 g

**DESCRIÇÃO:** PADOCK PLUS NF é um vermífugo oral de amplo espectro desenvolvido para uso em equídeos. A associação de ivermectina e praziquantel tem ação muito eficaz no tratamento e controle de endoparasitoses que afetam os equídeos, incluindo as causadas por tênias.

**INDICAÇÕES:** PADOCK PLUS NF é indicado no tratamento e controle das verminoses que acometem os equinos, asininos e muaras, a saber: Vermes gastrintestinais;

Grandes estrongilídeos;

*Strongylus vulgaris* (Formas adultas e estágios arteriais); *Strongylus edentatus* (Formas adultas e estágios tissulares); *Strongylus equinus* (Formas adultas); *Triodontophorus spp.* (Formas adultas).

Pequenos estrongilídeos:

*Cyathostomum spp.* (Formas adultas e larvas de 4º estágio); *Cylicocyclus spp.* (Formas adultas e larvas de 4º estágio); *Cylicostephanus spp.* (Formas adultas e larvas de 4º estágio); *Gyatocephalus capitatus*.

Outros vermes redondos:

*Habronema muscae*; *Trichostrongylus axei*; *Strongyloides westeri*; *Oxyuris equi* (Formas adultas e imaturas); *Parascaris equorum* (Formas adultas, formas imaturas (L4) e formas migratórias (L3)); *Onchocerca sp.* (Microfilárias)

Vermes pulmonares: *Dictyocaulus amfii* (Formas adultas e larvas de 4º estágio)

Gasterófilos: *Gasterophilus spp.* (Estágios orais e gástricos)

Dermatoses causadas por larvas cutâneas (Feridas de verão):

*Habronema spp.*; *Draschia spp.*

Cestódeos (Tênia):

*Anoplocephala perfoliata*;

*Anoplocephala magna*;

*Paranoplocephala mamillana*

**VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:** PADOCK PLUS NF deve ser administrado diretamente por via oral, utilizando a seringa que acondiciona o produto. Após o ajuste do êmbolo de acordo com o peso do animal, introduzir o bico da seringa em sua boca e administrar o produto sobre a língua. O uso de PADOCK PLUS NF não altera a rotina do animal, não havendo necessidade de jejum prévio e/ou qualquer modificação na dieta, no entanto, recomenda-se não dar água para o animal beber logo após a administração do produto.

**POSOLOGIA:** PADOCK PLUS NF deve ser administrado, em dose única, na dose equivalente a 0,2 mg de Ivermectina por Kg de peso corporal e de 2,5 mg de Praziquantel por Kg de peso corporal. Esta posologia corresponde a 1 (um) grama do produto para cada 100 Kg de peso corporal.

**CONTRAINDICAÇÕES:** Não usar em equídeos destinados ao consumo humano. Não utilizar em animais que apresentem comprometimento da barreira hemato-encefálica.

**LIMITAÇÕES DE USO:** Utilizar com cautela quando os animais estiverem em tratamento com agentes que deprimem o sistema nervoso central.

**PRECAUÇÕES GERAIS:** Uso exclusivo em equídeos. Obedecer as dosagens e recomendações para uso do produto. Não exercitar o animal antes da aplicação. Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.

A higiene é fundamental; sempre lavar as mãos antes e depois de manusear qualquer produto veterinário. Não utilize e nem guarde perto de bebidas, alimentos, outros medicamentos e produtos de higiene. Não reutilizar a embalagem vazia. Não contaminar rios, lagos ou outros mananciais, com a embalagem do produto, pois o mesmo é tóxico para peixes e outros organismos aquáticos.

**APRESENTAÇÕES:** Seringas descartáveis de plástico com êmbolo graduado contendo 6 g (apresentação individual) e 30 g (apresentação multídose).

**TABELA ORIENTATIVA DE DOSES:**

Peso corporal	Dose
Até 100 Kg .....	1,0 g
Até 200 Kg .....	2,0 g
Até 300 Kg .....	3,0 g
Até 400 Kg .....	4,0 g
Até 500 Kg .....	5,0 g
Até 600 Kg .....	6,0 g

**Obs:** Cada seringa de 6 g é suficiente para tratar 600 Kg de peso corporal.