

PAIN-OXX

PASTA ORAL À BASE DE FIROCOXIBE
ANTI-INFLAMATÓRIO PARA EQUINOS

USO VETERINÁRIO



Fórmula:

Cada 100 g do produto contém:

Firocoxibe	0,820 g
Excipientes q.s.p.	100,00 g

Descrição:

PAIN-OXX é uma pasta oral à base de firocoxibe, um anti-inflamatório não esteroideal (AINE) da classe dos coxibes, para uso em equinos. O firocoxibe inibe a produção das prostaglandinas que contribuem para a dor e inflamação (COX-2) e poupa aquelas que mantêm as funções gastrointestinal, plaquetária e renal normais (COX-1), sendo assim, pode ser utilizado para tratar a inflamação de tecidos moles ou músculosqueléticos, associada a condições pós-cirúrgicas, traumas, osteoartrites, entre outros. Auxilia também no controle da dor e febre associadas aos processos inflamatórios, especialmente em casos de osteoartrite crônica e doença do manequil em equinos, reduzindo os sinais de claudicação.

Indicação:

PAIN-OXX é indicado para equinos no tratamento de inflamações de tecidos moles ou músculosqueléticos, de origem pós-traumática ou pós-cirúrgica.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Modo de usar e posologia:

PAIN-OXX deve ser administrado pela via oral na dose de 0,1 mg de firocoxibe por Kg de peso vivo. Cada graduação de seringa com 14,64 g do produto (multidose) corresponde à dose para tratar 50 Kg de peso. Graduar a seringa de acordo com o peso do animal, posicionar o bico da seringa entre os dentes e

pressionar o êmbolo, depositando o medicamento na porção posterior da língua do animal.

Deve-se levantar a cabeça do animal por breve espaço de tempo para ter a certeza de que o medicamento foi totalmente ingerido.

Antes da administração do produto, deve-se assegurar que não haja alimento na cavidade oral do animal.

A apresentação fornece 8,2 mg de firocoxibe por grama de produto, ou seja, cada seringa de 14,64 g é suficiente para tratar 1.200 Kg de peso corporal.

Intervalos entre as aplicações:

Administrar o produto 1 (uma) vez ao dia, por até 14 dias consecutivos.

Interações medicamentosas:

O uso concomitante do princípio ativo firocoxibe com outras substâncias como medicamentos inibidores da ECA (por exemplo, enalapril e benazepril) e diuréticos (como a furosemida) podem resultar em redução dos seus efeitos sobre a pressão arterial e diurese, respectivamente.

Quando associado a aspirina e corticosteroides (por exemplo, prednisona) podem aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal, com a ocorrência de ulceração, sangramento, vômito e diarreia.

Os AINEs, de maneira geral, podem aumentar os níveis séricos de digoxinas. E, quando associado a drogas nefrotóxicas (por exemplo, furosemida, aminoglicosídeos, anfotericina B, etc.), pode aumentar o risco de nefrotoxicidade.

Reações adversas:

O estudo de segurança controlado conduzido em equinos com idade a partir de 12 meses não evidenciou a ocorrência de eventos adversos relacionados ao produto.

Efeitos colaterais leves decorrentes da administração do firocoxibe estão associados à ocorrência de diarreia e inapetência. Animais menores de 7 meses são sensíveis a altas doses deste medicamento.

Caso ocorram eventos adversos persistentes, de maior intensidade ou não mencionados nesta bula, o tratamento deve ser suspenso e o médico-veterinário deverá ser consultado.

Contraindicações e limitações de uso:

- PAIN-OXX não deve ser utilizado em animais com hipersensibilidade ao firocoxibe ou a outros AINES.
- O medicamento deve ser usado com cautela e monitoramento intensificado em pacientes com disfunção renal, hepática ou cardiovascular preexistente e naqueles que estão desidratados, hipovolêmicos, hipotensos ou em terapia diurética concomitante.
- O produto é contraindicado em animais com doenças ulcerativas gastrointestinais ativas e em pacientes com distúrbios hemorrágicos ou trombocitopenia.
- A segurança do produto não foi avaliada em animais abaixo de 12 meses de idade e em fêmeas prenhes e lactantes.

Precauções gerais:

- Ler a bula atentamente antes de usar o produto;
- Recomenda-se não exceder a dose indicada em bula;
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto;
- Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica;
- Pessoas com hipersensibilidade conhecida aos componentes ativos da fórmula devem evitar o contato com o produto veterinário;
- Evitar o contato com a pele, utilizando luvas ao manipular o produto;
- Lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário;
- Em caso de contato acidental com os olhos, lavar a bundantemente com água corrente. Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito e consultar o médico levando consigo a bula do produto;
- Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido;
- Não reutilizar as embalagens vazias e descartá-las conforme legislação vigente para evitar a contaminação do meio ambiente.

Período de carência:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

EQUINOS: ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Apresentação:

Seringas plásticas contendo 14,64 g.

Prazo de validade:

2 anos após a data de fabricação.

Após abertura da seringa, utilizar todo o produto em até 45 dias.

Mantenha este ou qualquer outro medicamento fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o número 104/2020, em 04/11/2020.

Responsável Técnico:

Dr. Cassio R. Murin - CRMV/SP nº 6.473.

Proprietário e Fabricante:

Sespo Indústria e Comércio Ltda.

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale.

Rua Manoel Joaquim Filho, 303

CEP: 13148-115 – Paulínia/SP

CNPJ: 50.464.692/0001-05

