

Partomicina

USO VETERINÁRIO

ASSOCIAÇÃO ANTIBIÓTICA DE USO INJETÁVEL

Fórmula:
Cada frasco com, no mínimo, 7,91 g de pó para reconstituição contém:
Penicilina G Sódica ..... 2.000.000 UI
Penicilina G Clemizolo ..... 2.000.000 UI
Di-hidroestreptomicina (sulfato) ..... 3,09 g*
Maleato de ergometrina ..... 0,005 g
Vitamina K3 (bissulfito sódico de menadiona) ..... 0,72 g
* equivalente a 3,86 g de Sulfato de di-hidroestreptomicina

Cada frasco de diluente estéril contém:
Difilina ..... 1,050 g
Excipientes q.s.p. ..... 20,00 mL

Indicações:
A PARTOMICINA é indicada para o tratamento de retenções de placenta de bovinos e infecções bacterianas associadas, causadas pelos microrganismos sensíveis *Escherichia coli*, *Fusobacterium necrophorum*, *Enterococcus faecalis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae* e *Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes*.

Farmacodinâmina e farmacocinética:
As penicilinas impedem a síntese da parede celular bacteriana, inibindo a formação da camada de muco-peptídeos, resultando na instabilidade e morte celular durante a multiplicação da bactéria. A di-hidroestreptomicina é um antimicrobiano da classe dos aminoglicosídeos. Este grupo de agentes tem um espectro de ação curto, com atividade predominante sobre gram-negativos e muito utilizado nas associações com penicilinas. Ligam-se à subunidade 30S do ribossomo da bactéria, provocando a leitura incorreta do código genético, interferindo na síntese proteica. O maleato de ergometrina é um alcaloide de ergot, um agente modulador adrenérgico, que atua nos receptores de adrenalina e serotonina, estimulando a musculatura lisa do útero, brônquios e vasos sanguíneos. A difilina é uma metilxantina, antagonista competitivo de receptores de adenosina com ação moduladora sobre o sistema nervoso central e cardíaco, agindo no córtex sensorial, aumentando sua excitabilidade e estimula os centros respiratórios bulbares. A vitamina K3 auxilia no controle de hemorragias, devido a sua participação na reação de carboxilação da síntese dos fatores de coagulação sanguínea ativos II (protrombina), VII (proconvertina), IX (fator Christmas) e X (fator Stuart) no fígado. Em estudos de farmacocinética com a PARTOMICINA, a concentração máxima da penicilina G nos animais tratados pela via intramuscular, foi de 1.751,20 µg/L, que corresponde à 0,5 hora após a administração do produto (T máx). Já, para a di-hidroestreptomicina, a concentração máxima foi de 17.920,00 µg/L, que corresponde a aproximadamente 1 hora após a administração do produto (T máx).

Posologia e modo de usar:
A PARTOMICINA deve ser utilizada por via intramuscular profunda. Com o auxílio de uma seringa e agulha descartáveis, transferir todo o conteúdo de um frasco diluente (20 mL) para o frasco de pó, no momento da aplicação. Agitar para solubilizar o conteúdo. O produto deve ser usado imediatamente após a reconstituição.

Recomenda-se a aplicação de 20 mL da solução reconstituída de PARTOMICINA por animal. Administrar uma segunda dose após 24 horas, a critério do médico-veterinário.

Atenção: efetuar o tratamento logo após a observação da retenção de placenta do animal (ou após o parto do animal), de preferência no decorrer da intervenção obstétrica.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
<u>BOVINOS:</u> ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 41 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 8 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Contraindicações e limitações de uso:
- Não utilizar o produto em animais com hipersensibilidade aos componentes da formulação;
- Não utilizar o produto em animais com insuficiência renal e hepática;
- Não utilizar o produto em associação com eritromicina e tetraciclinas;
- Não utilizar o produto em associação à dopamina;
- Não utilizar o produto em animais para a indução de parto;
- Não utilizar o produto em animais com hipertensão ou doença vascular.

Reações adversas:
Em animais sensíveis às penicilinas, reações de hipersensibilidade podem se manifestar através de erupções cutâneas, febre, eosinofilia, neutropenia e anemia.

Precauções gerais:
- Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto;
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto;
- Usar luvas de proteção;
- Lavar as mãos após o manuseio do produto;
- Pessoas com alergia a penicilinas devem manusear o produto utilizando equipamentos de proteção individual correspondentes ou evitar exposição;
- Em caso de contato com pele ou olhos, lavar imediatamente com água;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente;
- No caso de reações adversas em humanos que tiveram contato com o produto, procurar auxílio médico e apresentar a embalagem ou bula do produto. No caso de inchaço na face, lábios, membros, olhos ou dificuldade para respirar, procurar auxílio médico com urgência;
- Não utilizar nem guardar perto de bebidas, alimentos, medicamentos e produtos de higiene doméstica.
- Não utilizar a embalagem vazia e descartá-la conforme legislação vigente.

Apresentação:
Frasco ampola de vidro de 50 mL contendo 7,91 g de pó e frasco ampola de vidro contendo 20 mL de diluente estéril.

Prazo de validade:
Vinte e quatro meses (2 anos) após a data de fabricação. Após a reconstituição, todo o conteúdo do frasco deve ser utilizado imediatamente.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.
Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

Licenciado no MAPA sob o n°: SP 000129-0.000013 desde 12/03/2007.

Responsável Técnico:
Dr. Cassio R. Murin
CRMV-SP 6473

Proprietário:
Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Paulínia/SP
CEP: 13148-115
CNPJ: 50.464.692/0001-05

Fabricante do diluente:
Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Paulínia/SP
CEP: 13148-115
CNPJ: 50.464.692/0001-05

Fabricante do pó para reconstituição:
Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rod. Raposo Tavares, km 113 - Barreiro
Araçoiaba da Serra/SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52

P50367 V202

CEVA SAC:
0800-770-0355
sac@ceva.com