

299,95 mm Distancia entre tacos

20 mm
Refile

zipper
40 mm
de la boca
abrefácil
a 30 mm



USO VETERINÁRIO
PROGICLAR
Progesterona 750 mg

CADA DISPOSITIVO CONTEM:
Progesterona (4-pregnen-3, 20-diona) micronizada 750 mg
Excipientes q.s.p. 10,5 g

INDICAÇÕES
Sincronização de cio e sincronização de cio para IATF em bovinos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO
MÉDICO-VETERINÁRIO.
Licenciado no MAPA sob nº 9633 em 11/10/2011.
DOSE
750 mg.

T00021 V304

FORMA DE APLICAÇÃO E POSOLOGIA
Utilizando luvas de látex, inserir o dispositivo no aplicador, desinfectar em solução de amônia quaternária a 0,5%, realizar a higiene da região perivulvar e aplicar pela via intravaginal. Utilizar um dispositivo por animal. São sugeridas as seguintes posologias para cada utilização. A posologia pode ser modificada de acordo com a indicação do médico-veterinário.

Condições de conservação: conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco à temperatura ambiente (15° a 30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
APRESENTAÇÃO
Bolsa contendo 10 dispositivos.

	Dia 0	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Serviço
Sincronização do cio	Colocar o dispositivo + aplicar 2 mg de benzoato de estradiol	—	Retirar o dispositivo + aplicar 150 µg de D-dioprosteno!	—	a) I.A.: detectar o cio durante 4 dias após a retirada do dispositivo, realizar I.A. 12 horas após detecção do cio b) Monta natural: colocar touros durante 4 dias após a retirada do dispositivo
Sincronização do cio para IATF	Colocar o dispositivo + aplicar 2 mg de benzoato de estradiol	—	Retirar o dispositivo + aplicar 150 µg de D-dioprosteno!	Aplicar 1 mg de benzoato de estradiol	Realizar a IATF 54 horas após a retirada do dispositivo

CONTAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO
- Não utilizar em animais com insuficiência renal e/ou hepática.
- Não utilizar em animais com endometrite, vaginite ou vulvovaginite.
- Não utilizar em animais hipersensíveis ao princípio ativo e/ou componentes do excipiente.
- Não utilizar em animais desnutridos.
- Não utilizar em animais pré-púberes.

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:
Productos Veterinarios S.A.
Registered Facility Nº 8967
Ruta 168 - Paraje El Pozo - Lote B1 - Parque Tecnológico Del Litoral
Centro (PTLC) - Santa Fe (3000) - Argentina
PRODUCTO IMPORTADO
REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO BRASIL
IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:
Ceva Saúde Animal



Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rod. MG 050, Km 18,5, nº 2001
Distrito Industrial - Juruaba/MG - CEP: 35675-000
CNPJ: 07.086.487/0001-16
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Gustavo Montaldi Cavalho - CRM/V/MG 13.060



PRECAUÇÕES:
- Verificar a inviolabilidade da embalagem, as condições de armazenamento antes do uso e o prazo de validade, em referência a data de vencimento indicada no rótulo.
- Limpar a vulva antes da aplicação do dispositivo.
- Lubrificar a vagina com lubrificante obstétrico, antes da aplicação (principalmente novilhas).
- Não reutilizar o dispositivo.
- O dispositivo não deve ser manuseado por mulheres grávidas.
- Não manusear o dispositivo sem a utilização de luvas.

60 mm + 60 mm Fuelle
880 mm Ancho Total de Material

Contém:
10 unidades

DISPOSITIVO
INTRAVAGINAL
PARA BOVINOS

Progesterona 750 mg



ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS:
ABATE: CARÊNCIA ZERO. LITE: CARÊNCIA ZERO.
OS DISPOSITIVOS DEVEM SER REMOVIDOS ANTES DO ABATE.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.



zipper
40 mm
de la boca
abrefácil
a 30 mm



360 mm Frente

360 mm Dorso

20 mm
Refile