



MEDICAÇÃO TÔNICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Hidrolisado de caseína 5,0 g

Cálcio fosforilcloreto de colina 5,0 g

Excipientes q.s.p. 100,00 mL

DESCRIÇÃO:

ROBOFORTE INJETÁVEL é uma medicação tônica de grande valor terapêutico, especialmente indicado em situações de desequilíbrio metabólico ou energético.

O cálcio-fosforilcloreto de colina, além de atuar como fonte de cálcio, também funciona como fonte de fosforilcolina, substância de grande importância no ponto de vista bioquímico. Esta combinação fosfórica poupa energia e, por isso, também oferece acetilcolina para o organismo.

O hidrolisado de caseína é composto por uma mistura de 18 aminoácidos, sendo 10 deles essenciais, ou seja, aqueles que o organismo do animal não é capaz de sintetizar: Arginina, fenilalanina, isoleucina, histidina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano e valina; e mais 8 aminoácidos que podem ser sintetizados pelo organismo do animal: Ácido aspártico, ácido glutâmico, alanina, cisteína, glicina, prolina, serina e tirosina.

INDICAÇÕES:

É indicado para bovinos, a partir do 2º dia de vida, e equinos, a partir de 1 ano, na prevenção e como auxiliar no tratamento dos desequilíbrios metabólicos e nutricionais relacionados aos componentes da fórmula do produto.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Bovinos: 1mL de produto para cada 20kg de peso vivo, pela via de administração intravenosa lenta ou subcutânea, em dose única.

Equinos: 1mL de produto para cada 20kg de peso vivo, pela via de administração intramuscular, em dose única. Quando a dose a ser aplicada por animal ultrapassar a quantidade de 10mL do produto ROBOFORTE INJETÁVEL, recomenda-se dividir a dose total em dois pontos distantes de aplicação.

A duração do tratamento, bem como a posologia, poderá ser ajustada pelo médico-veterinário de acordo com as necessidades dos animais.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

A segurança do produto não foi testada em fêmeas prenhes e lactantes.

ADVERTÊNCIAS:

- Não utilizar o produto em animais sensíveis ao(s) princípio(s) ativo(s) da fórmula;
- Não misturar o produto na mesma seringa com outros medicamentos.
- A suplementação excessiva de cálcio pode levar ao quadro de hipercalcemia e, consequentemente, distúrbios renais, gastrointestinais, cardiovasculares, neuromusculares, com depressão do sistema nervoso

central, letargia, fraqueza muscular, anorexia, vômito, polidipsia, poliúria, constipação intestinal, arritmias cardíacas, e convulsões, assim como mineralização de tecidos moles, particularmente rins e coração.

- A suplementação excessiva de fósforo pode levar ao quadro de hiperfosfatemia, que pode indiretamente causar hipocalcemia, e a longo prazo ocasionar hiperparatireoidismo nutricional secundário, osteodistrofia fibrosa e calcificação metastática em locais extraósseos.

REAÇÕES ADVERSAS:

Embora muito raramente, poderão ocorrer casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Recomenda-se cautela quando da administração intravenosa em animais hipersensíveis aos componentes do produto.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.
LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS

EQUINOS:

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE EQUINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

PRECAUÇÕES GERAIS:

- Obedecer às dosagens e recomendações de uso do produto;
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto;
- Lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário;
- Em caso de contato acidental com a pele, olhos e boca, lavar abundantemente com água;
- Não armazenar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou domésticos;

- Não reutilizar as embalagens vazias e descartá-las conforme legislação vigente, para evitar a contaminação do meio ambiente;
- Conservar em local seco, ao abrigo da luz solar e à temperatura entre 15 e 30 °C.
- Após aberto, utilizar todo o conteúdo do frasco em até 90 dias.

APRESENTAÇÃO:

Frascos contendo 250mL, 500mL e 1L.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Conservar em local seco, ao abrigo da luz solar e à temperatura entre 15 e 30 °C. Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado provisoriamente no MAPA sob nº 68/2022, em 15/12/2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dr. Cassio R. Murin - CRMV-SP nº 6.473

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Sespo Indústria e Comércio Ltda
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale Ltda.
Rua Manoel Joaquim Filho, 303
CEP: 13148-115 - Paulínia/SP
CNPJ: 50.464.692/0001-05

