



FÓRMULA:

Cada 100mL contém:
Tilosina (sob forma base) 20,0 g
Veículo q.s.p. 100,0 mL

INDICAÇÕES:

TYLADEN é indicado para tratamento de suínos e bovinos acometidos por infecções causadas pelos microrganismos:

-Suínos: *Clostridium perfringes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus hyicus* e *Streptococcus suis*.

-Bovinos: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Pasteurella multocida*, *Streptococcus uberis* e *Streptococcus agalactiae*.

MODO DE USAR:

Injetável por via intramuscular.

POSOLOGIA:

Dose média: 10 mg do produto/kg de peso, sendo:
Bovinos: 5 mL do produto/100 kg de peso/dia (3 dias no mínimo).
Suínos: 1 mL do produto/20 kg de peso/dia (3 dias no máximo).

OBSERVAÇÃO:

Nos casos de mastite por *Mycoplasma*, paralelamente ao primeiro tratamento por via intramuscular, podem ser inoculados, por via intramamária, 2 mL do produto, diluídos em 20 mL de propilenoglicol estéril.

ATENÇÃO:

O tratamento deve ser prolongado por mais 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

EFEITOS COLATERAIS:

Em suínos, pode produzir irritação no local da aplicação. Podem ocorrer petéquias, pruridos cutâneos, edema de vulva e prolapso de reto.

PRECAUÇÕES:

Interromper o tratamento se o edema vulvar e o prolapso não regredirem.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

A tilosina não deve ser associada a antibióticos bactericidas.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 20 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO 4 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO, O LEITE DEVE SER DESCARTADO.

SUÍNOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 16 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

APRESENTAÇÕES:

Frasco-ampola de vidro contendo 50 mL e 100 mL.

Prazo de validade: 2 (dois) anos após a data de fabricação.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

MANTENHA ESTE OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 °C e 30 °C.

Licenciado pelo Mapa desde 25/08/1997. Registrado sob o número SP 000129-0.000043.

Responsável Técnico: Dra. Janaína Carlstron
CRMV-SP: 21.555

Proprietário e Fabricante:
Sespo Indústria e Comércio LTDA
Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Rua Manoel Joaquim Filho, 303
CEP: 13.148-115 - Paulínia - SP
CNPJ: 50.464.692/0001-05

 **CEVA SAC:**
0800-770-0355
sac@ceva.com

