USO VETERINÁRIO

TIFOPASTEURINA

BACTERINA MISTA CONTRA PASTEURELOSE BOVINA E PARATIFO DOS BEZERROS

Conservar entre 2 °C e 8 °C
Agite antes de usar

Conteúdo: 25 doses

P50192 V301

7 898172 272249

Composição:
Suspensão de *Salmonella dublin*, *Pasteurella multocida* e *Salmonella typhimurium*, em soro fisiológico fenicado a 0,5% inativadas pela adição de formalina a 40%.

Indicação:
Prevenção da pasteurelose bovina e paratifo dos bezerros.

Dosagem:
Dose de 2 mL tanto para vacas como para bezerros.

Modo de usar:
A vacina deve ser aplicada por via subcutânea.
Vaca: vacinar no 8º mês de gestação.
Bezerro: 1ª vacinação entre 15 e 30 dias de idade.
2ª vacinação 4 semanas depois.

Observações:
No caso de surto de salmonelose e/ou pasteurelose na região, recomenda-se a vacinação de todos os animais de rebanho, na dose única de 2 mL, por via subcutânea.

Licenciado no MAPA sob nº 733 em 04/10/1978.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Proprietário e Fabricante:
Ceva Saúde Animal
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rod. MG 050, Km 18, 5, nº 2001
Distrito Industrial - Juatuba/MG
CEP: 35675-000
CNPJ: 07.086.487/0001-16

Responsável Técnico:
Gustavo Montaldi Carvalho
CRMV/MG 13.060

SAC: 0800-770-0355
sac@ceva.com

Para partida, fabricação e vencimento: **VIDE FRASCO.**