

TILMICOVET



USO VETERINÁRIO

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Tilmicosina 30,0 g
Excipiente q.s.p. 100,0 mL

Farmacocinética do produto/biodisponibilidade:

A tilmicosina apresenta-se principalmente sob a forma não ionizada, sendo altamente lipossolúvel e parcialmente ligada a proteínas plasmáticas, o que possibilita ampla e rápida distribuição. A tilmicosina é incorporada e transportada principalmente pelos macrófagos e polimorfonucleares ativados, de modo que alcança o tecido infectado rapidamente, alcançando concentrações maiores que 3,12 µg/mL e permanecendo no local infectado por até 72 horas após a aplicação. A tilmicosina apresenta efeito pós-antibiótico in vitro frente a alguns Gram negativos importantes como *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Bordetella bronchiseptica* e *Actinobacillus pleuropneumoniae*, por até 8 horas após serem alcançadas concentrações 8 vezes maiores que a CIM.

Farmacodinâmica do produto (resumo):

A tilmicosina é um antibiótico macrolídeo derivado da tilosina. Assim como todos os macrolídeos, exerce efeito bacteriostático, nesse caso, através da inibição da síntese proteica bacteriana pela ligação à subunidade ribossomal 50S. Possui amplo espectro, com atividade significativa frente a bactérias Gram negativas e micoplasmas.

Indicações:

Tratamento de enfermidades causadas pelos microrganismos: *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*).

Modo de usar:

Bovinos: 10 mg de tilmicosina por cada 1 Kg de peso vivo (equivalente a 1,0 mL de Tilmicovet por cada 30 Kg de peso vivo), a cada 72 horas, por via subcutânea. A duração do tratamento dependerá do critério do médico-veterinário.

Precauções de uso:

Conservar em local seco e fresco (entre 15 °C e 30 °C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Efeitos colaterais:

Não há registro de efeitos nocivos quando utilizado nas dosagens indicadas.

Apresentação:

Frasco de 100 mL.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado no MAPA sob o nº 10.133 em 19/08/2015

Proprietário e Fabricante:

Productos Veterinarios S.A.
Registered Facility N° 8567
Ruta 168 - Paraje El Pozo - Lote B1
Parque Tecnológico Del Litoral Centro (PTLC)
Santa Fe (3000) - Argentina

PRODUTO IMPORTADO

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

Ceva Saúde Animal
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rod. MG 050, Km 18,5, nº 2001 - Distrito Industrial
Juatuba/MG - CEP: 35675-000
CNPJ: 07.086.487/0001-16

Responsável Técnico:

Gustavo Montaldi Carvalho - CRMV/MG 13.060

