

RETARDO ESTERÓIDE INJETÁVEL



USO VETERINÁRIO

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Triancinolona acetônica	0,2 g
Excipiente q.s.p.	100,00 mL

Descrição:

A triancinolona pertence à classe dos anti-inflamatórios esteroidais. Essa molécula atua diretamente nos receptores nucleares de esteroides, após sua entrada na célula, liga-se e ativa o receptor glicocorticoide, que desencadeia a translocação do complexo ligante-receptor para o núcleo e estimula a expressão de genes responsivos a glicocorticoides, como as lipocortinas, e estas inibem a fosfolipase A2, que bloqueia a liberação de ácido araquidônico de fosfolípidos de membrana. A indicação terapêutica está associada a bloquear manifestações precoces do processo inflamatório como dor, calor e rubor, e até as mais tardias, como reparação e proliferação tecidual.

Na clínica de equinos, seu principal uso é para traumas articulares. A injeção intra-articular de triancinolona acetônica, particularmente em processos inflamatórios de articulações de alto movimento, é frequentemente recomendada por Médicos-Veterinários, pois estudos demonstraram que a injeção intra-articular pode melhorar a claudicação clínica e reduzir a infiltração de células inflamatórias.

Indicação:

RETARDESTERÓIDE INJETÁVEL é indicado nos casos de inflamações articulares de equinos, a partir dos 12 meses de idade, causadas por infecções, alergias, traumatismos ou outras etiologias.

“A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária”

Modo de usar e posologia:

Via intra-articular: Administrar a dose única de 5 a 9 mL de RETARDOESTERÓIDE INJETÁVEL/equino, que corresponde a 10 a 18 mg de Triancinolona acetônica/animal.

Precauções que devem se adotar antes da administração do produto:

- Agitar o produto antes de usar.
- Preparar a área de injeção assepticamente, antes da aplicação, evitando a injeção em grandes vasos sanguíneos, nervos ou tecidos moles que circundam a articulação.

Contraindicações:

- Os glicocorticoides, como a triancinolona acetônica devem ser evitados em animais com doenças infecciosas, devido a sua ação imunossupressora.
- Não administrar em animais com infecções bacterianas, sem antibioticoterapia concomitante.

Incompatibilidades e interações medicamentosas:

Não administrar juntamente com:

- Outros corticosteroides: em caso de existirem enfermidades infecciosas.
- Anti-histamínicos: aumentam a degradação da triancinolona.

Restrições de uso:

Não administrar em fêmeas gestantes durante o último terço de gestação, pois pode causar um parto prematuro seguido de distocia, morte fetal, retenção de placenta e metrite. Não administrar em equinos cuja carne seja destinada ao consumo humano.

Efeitos secundários:

Provoca retardamento na cicatrização das feridas. Em alguns casos, pode originar-se laminita. A administração intra-articular pode produzir dor, além de outros sintomas locais antes de se conseguir o resultado.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
EQUINOS: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS
PRODUTORES DE CARNE PARA CONSUMO HUMANO.**

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Precauções:

- Ler a bula atentamente antes da aplicação do produto.
- Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto.
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.
- Lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário.
- Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica.
- Não reutilizar as embalagens vazias e descartá-las conforme a legislação vigente.
- Mantenha este, ou qualquer outro medicamento veterinário, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Agitar o produto antes de usar.
- Não administrar uma terapia concomitante com outros corticosteroides em caso de existirem enfermidades infecciosas.
- Preparar a área de injeção asepticamente antes da aplicação, evitando a injeção em grandes vasos sanguíneos, nervos ou tecidos moles que circundam a articulação.
- Venda sob prescrição obrigatória e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Apresentação:

Frascos de vidro com 50 mL.

Prazo de validade:

2 anos após a data de fabricação do produto.
Após aberto, utilizar todo o conteúdo do frasco em até 6 meses

MANTENHA ESTE OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15°C E 30°C.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO OBRIGATÓRIA E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agriculturae Pecuária, sob número 25/2025, em 09/07/2025.

Responsável Técnico:

Gustavo Montaldi Carvalho - CRMV-MG n.º 13.060.

Proprietário e fabricante:

CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale.
Rod. MG 050, nº 2001 - Distrito Industrial
Juatuba/ MG - CEP: 35675-000
CNPJ: 07.086.487/0001-16

