

PROTOCOLO DE CONFINAMENTO CEVA

**MAIS DESEMPENHO
E PRODUTIVIDADE
NO SEU REBANHO.**



QUAL A IMPORTÂNCIA DO PROTOCOLO SANITÁRIO DE ENTRADA?

Controle dos principais parasitas e prevenção das principais doenças, que podem acometer os animais durante o período de confinamento. Estes procedimentos são fundamentais para evitar os impactos negativos no desempenho, reduzir a morbidade e a mortalidade de animais.

Antiparasitários

Verminoses e ectoparasitos

- Eprecis e Combo Pour On (confinamentos até 120 dias para o abate);
- Puritec Gold ou Ticson 3.50 e Combo Pour On (confinamentos acima 120 dias para o abate);

Vacinas

- Botulinomax: vacina que previne as principais Clostridioses, incluindo o botulismo
- Rabmune: vacina que previne a raiva nas regiões onde a doença ocorre com frequência
- Tifopasteurina: vacina que previne a ocorrência das pneumonias bacterianas

*** Vacinas devem ser aplicadas com dose + reforço (28-30 dias de intervalo) para maior proteção.*



PROTOCOLO DE CONFINAMENTO



Eprecis

Dose / Via aplicação

1 mL/100 Kg; SC.

Período de carência

12 dias



Roboforte

Dose / Via aplicação

1 mL/20 Kg; SC.

Período de carência

ZERO



Combo

Dose / Via aplicação

10 mL/100 Kg; P.O. (Máx. 60 mL)

Período de carência

6 dias



Botulinomax

Dose / Via aplicação

5 mL/animal; SC.

Período de carência

ZERO



Rabmune

Dose / Via aplicação

2 mL/animal; SC.

Período de carência

ZERO



Tifopasteurina

Dose / Via aplicação

2 mL/animal; SC.

Período de carência

ZERO

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA RECEPÇÃO DOS ANIMAIS

O desembarque deve ser feito de forma tranquila, sem correrias, gritos (manejo racional) diminuindo o estresse aos animais e evitando contusões

Observação

- Deve-se verificar se não estão mancando
- Se há ferimentos nos pés ou outros locais
- Olhos (fundos, significam desidratação e problemas de saúde)
- Excesso de lágrimas pode significar irritação (poeira, por exemplo)
- Lesões oculares ou até mesmo infecções

Nariz e respiração

- Não deverão apresentar excesso de corrimento e, caso exista, deverá ser claro e transparente. Observar se há tosse (espontânea ou provocada), respiração com a boca aberta com roncoss ou chiados.
- Caso haja alterações que demonstrem animais doentes, os mesmos deverão ser examinados e tratados da forma correta.
- Se possível, manter os animais em piquetes com cocho para mineralização e suplementação (dieta de adaptação), bebedouros com água de boa qualidade, a fim de que se reidratem, se ressocializem, estabelecendo padrão social no lote (hierarquias) e se acostumarem com os movimentos de pessoas e máquinas do confinamento. Esse período pode variar de 7 a 14 dias.

Estabelecer a rotina de Rondas Sanitárias

- Pessoas bem preparadas na identificação e tratamento precoce de problemas. Esse procedimento aumenta a taxa de sucesso dos tratamentos

SUPLEMENTO NUTRICIONAL

Roboforte® Injetável

Reativador do metabolismo, melhorando o apetite e reduzindo ocorrências de refugo de cocho, além de reforço ao sistema imunológico dos animais.

Roboforte® Injetável comprovou um GMD de mais que 300g em bovinos confinados*, possibilitando um melhor desempenho na pecuária de resultados.



*PINTO et al., 2019



Juntos, além da saúde animal

