



# FOLI-REC<sup>®</sup> LÍQUIDO

---

Informações sobre o produto

# CONTEÚDO

- 1 | Nome do medicamento veterinário** 3
- 2 | Composição qualitativa e quantitativa** 3
- 3 | Forma farmacêutica** 3
- 4 | Indicações** 3
- 5 | Administração e posologia** 3
- 6 | Contraindicações e limitações de uso** 4
- 7 | Precauções** 4
- 8 | Reações adversas** 4
- 9 | Períodos de carência** 5
- 10 | Condições de armazenamento** 5
- 11 | Apresentações** 5
- 12 | Prazo de validade** 5

## 1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

FOLI-REC® Líquido

## 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada 100ml contém:

Gonadotrofina coriônica equina recombinante (reCG) ..... 7.000 UI

Excipientes q.s.p. .... 100,00ml

## 3. FORMA FARMACÊUTICA

Solução injetável, pronta para uso.

## 4. INDICAÇÕES

FOLI-REC® é indicado para promover maior capacidade ovulatória, pode ser utilizado em protocolos de superovulação e como complemento em protocolos de indução de cio e sincronização de ovulação, quando utilizado junto com outros hormônios reprodutivos como: progestágenos, benzoato de estradiol, prostaglandinas F2 $\alpha$  ou seus análogos sintéticos e hormônios liberadores de gonadotrofinas (GnRH).

## 5. PROPRIEDADES IMUNOLÓGICAS

**Produto pronto para uso.**

**FOLI-REC® deve ser administrado por via intramuscular em dose única, com as seguintes dosagens:**

- Sincronização de Estro em Vacas – 0,7 a 2,0 mL;
- Superovulação – 28,5 mL.

## 6. CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

O uso de FOLI-REC® é contraindicado em animais com hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula. O produto não foi testado em vacas gestantes. Não use o produto em fêmeas jovens e sexualmente imaturas. Doses elevadas produzem superovulação e não são aconselháveis para animais que serão inseminados ou acasalados (reprodução natural) devido à possibilidade de gestações múltiplas, exceto para fins de transferência de embriões.

O sucesso do uso do FOLI-REC® depende de protocolos reprodutivos hormonais adequados.

## 7. PRECAUÇÕES

### **Em animais:**

Uso exclusivo em fêmeas bovinas.

Não utilize o produto após o prazo de validade e após a abertura da embalagem, preste atenção ao prazo de validade do produto. Mantenha o produto em sua embalagem original e utilize seringas e agulhas estéreis, respeitando as boas práticas de assepsia. Siga as dosagens recomendadas ao usar o produto. Somente o veterinário pode fazer alterações nas dosagens do produto.

### **Em humanos:**

Ao utilizar o produto, proteja-se com luvas de borracha (luvas nitrílicas). Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas. Não coma, beba ou fume durante a aplicação. Não misture com outros produtos. Não reutilize embalagens. Restos de produtos e embalagens devem ser descartados conforme recomendação da legislação vigente, evitando contaminação do meio ambiente. Recomenda-se que o produto não seja administrado por gestantes, devido ao risco de injeção acidental. Neste caso, consulte imediatamente um médico e mostre a bula do produto. Não há antídoto. Leia atentamente a bula antes de administrar o produto.

## 8. REAÇÕES ADVERSAS

Quando usado de acordo com a dose indicada, não são esperados eventos adversos. No entanto, podem ocorrer reações de hipersensibilidade individuais. Nestes casos, recomenda-se interromper imediatamente o tratamento e estabelecer uma terapia sintomática à base de epinefrina, anti-histamínicos e glicocorticóides.

## 9. PERÍODOS DE CARÊNCIA

### **Bovinos:**

Carne e vísceras: 0 dias

Leite: 0 dias

## 10. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em condições refrigeradas entre 2° - 8°C, longe da luz solar e fora do alcance de crianças e animais de estimação.

## 11. APRESENTAÇÕES

Frascos de vidro contendo 30 mL do produto.

## 12. PRAZO DE VALIDADE

Prazo de validade do medicamento veterinário embalado para venda: 2 anos.

Prazo de validade após a abertura do frasco: 30 dias.

**Venda sob prescrição médica e administração sob orientação do médico-veterinário.**