



FIPROLINE DUO®



Informações

CONTEÚDO

1 Nome do medicamento veterinário	3
2 Composição qualitativa e quantitativa	3
3 Forma farmacêutica	3
4 Indicações	3
5 Administração e posologia	3
6 Intervalo entre aplicações	4
7 Advertências especiais	4
8 Reações adversas	5
9 Precauções	5
10 Períodos de carência	6
11 Condições de armazenamento	6
12 Apresentações	6
13 Prazo de validade	6

Estas páginas são páginas de informações gerais. Nenhuma garantia é dada quanto à integridade das informações contidas ou à sua conformidade com os requisitos regulamentares nacionais. Os usuários devem consultar o site local de seus países para obter informações que estejam em conformidade com os regulamentos nacionais aplicáveis.

1.

NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Fiproline Duo® Pour on e Spot on.

2.

COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada 100ml contém:

Fipronil 3g
Excipientes q.s.p..... 100,00mL

3.

FORMA FARMACÊUTICA

Solução de uso tópico (Pour on e Spot on).

4.

INDICAÇÕES

Fiproline Duo® é indicado para bovinos no tratamento contra moscas-dos-chifres (*Haematobia irritans*) e moscas-dos-estábulos (*Stomoxys calcitrans*), bernes (*Dermatobia hominis larvae*) e carrapatos (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*). Indicado também na prevenção e tratamento de miíases decorrentes de infestação por larvas de *Cochliomyia hominivorax* (moscas-da-bicheira).

5.

ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA

Administre Fiproline Duo® em bovinos, através de administração tópica, para tratamento e controle de infestações causadas por:

- Moscas-dos-chifres (*Haematobia irritans*) e carrapatos (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*): dose única, pour on (no dorso do animal), 1 mg de fipronil/kg de peso vivo, o que corresponde a 1 mL de Fiproline Duo/30 kg de peso vivo.
- Moscas-dos-estábulos (*Stomoxys calcitrans*), bernes (*Dermatobia hominis*) e miíase resultante de infestação por larvas de *Cochliomyia hominivorax* (moscas-da-bicheira): dose única, spot on, (em um único ponto, preferencialmente na região dorso-cervical - cernelha), 2 mg de fipronil/kg de peso vivo, o que corresponde a 1 mL de Fiproline Duo/15 kg de peso vivo.

A tabela abaixo mostra o cálculo de dosagem do produto veterinário:

Peso corporal vivo (kg)	Pour on 1 mg de fipronil/kg de peso corporal	Spot on 2 mg de fipronil/kg de peso corporal
	Volume a administrar (mL)	Volume a administrar (mL)
<30	1	2
60	2	4
90	3	6
120	4	8
150	5	10
210	7	14
270	9	18
330	11	22
390	13	26
450	15	30
510	17	34

Por ser de fácil aplicação, evita estresse e facilita o manuseio. Contém corante vermelho em sua formulação, o que auxilia na identificação dos animais tratados.

6. INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES

Estudos realizados com o produto veterinário demonstraram que a eficácia contra moscas dura 35 dias, a eficácia contra varejeiras dura 28 dias e a eficácia anti-carrapaticida dura 23 dias após o tratamento.

7. ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

- O produto veterinário não é recomendado para vacas produtoras de leite para consumo humano;
- Não utilizar em animais que apresentam sensibilidade ao fipronil;
- A segurança do Fiproline-Duo® não foi avaliada em atividades de reprodução, animais gestantes ou lactantes;
- A eficácia do produto veterinário não foi testada em animais molhados ou em animais que tomam banho imediatamente após a aplicação;
- O produto veterinário pode ser utilizado em bovinos a partir dos 12 meses de idade.

8.

REAÇÕES ADVERSAS

- Podem ocorrer reações de hipersensibilidade individuais. Nestes casos, é indicado tratamento sintomático. Não tratar o animal com o produto veterinário novamente;
- Em caso de reações adversas, informe imediatamente o veterinário.

9.

PRECAUÇÕES

- Respeite as dosagens e recomendações de uso do produto veterinário;
- Use apenas em bovinos;
- Não aplique em dias de chuva;
- Não fume nem coma enquanto manuseia o produto veterinário;
- Lave sempre as mãos após manusear qualquer produto veterinário;
- Aplique o produto veterinário conforme indicado na bula;
- Utilize com cautela em animais debilitados, idosos ou doentes;
- Ao manusear o produto veterinário utilize equipamentos de proteção individual adequados (luvas, máscara, macacão);
- Tóxico para peixes e invertebrados aquáticos;
- Não armazene nem aplique perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou domésticos;
- Mantenha este, ou qualquer outro medicamento veterinário, fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reaproveite embalagens vazias e descarte-as de acordo com a legislação vigente, para evitar contaminação do meio ambiente;
- Evite o contato com a pele, os olhos, as mucosas e a boca assim como a inalação do produto veterinário;
- Em caso de contato com a pele e os olhos, recomenda-se lavar com água corrente em abundância. Se a irritação persistir, consulte um médico levando a bula do produto veterinário. Em caso de ingestão acidental, deve-se procurar aconselhamento médico levando consigo a bula do produto veterinário. É possível que o vômito ocorra de maneira espontânea e, portanto, não deve ser evitado; neste caso, coloque o paciente em decúbito lateral para evitar que aspire resíduos.

Nota para o médico:

Em caso de ingestão, a intoxicação pode ser reduzida através de vômito provocado, dentro de meia hora após a exposição. O tratamento da intoxicação deve ser sintomático e, em casos graves, até que o paciente esteja estabilizado. Considerando o mecanismo de ação do fipronil, é aconselhável evitar medicamentos que estimulem o efeito GABA, como barbitúricos, benzodiazepínicos e ácido valpróico. Não há antídoto conhecido.

10.

PERÍODOS DE CARÊNCIA

Bovinos:

67 dias para o abate.

Não administrar aos animais produtores de leite para consumo humano.

A utilização do produto veterinário em condições diferentes das indicadas na bula, pode ocasionar a presença de resíduos do produto veterinário acima dos limites aprovados, tornando o alimento de origem animal impróprio para consumo.

11.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco, ao abrigo da luz solar e a uma temperatura entre 15° e 30°C.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

12.

APRESENTAÇÕES

Frascos plásticos contendo 250 mL, 1 L ou 5 L de produto veterinário.

13.

PRAZO DE VALIDADE

Prazo de validade do medicamento veterinário embalado para venda: 24 meses.

Prazo de validade após a primeira abertura da embalagem primária: 6 meses.

Venda sob prescrição médica e administração sob orientação do veterinário.