

FIPROLINE[®]

POUR ON & SPOT ON



FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Fipronil.....3g
Excipientes q.s.p100mL

DESCRIÇÃO:

FIPROLINE DUO[®] é uma formulação antiparasitária indicada exclusivamente para bovinos, à base de fipronil. Por ser de fácil aplicação, evita o estresse e facilita o manejo. Contém em sua formulação um corante vermelho, que auxilia na visualização dos animais tratados. Inibe em 80% a reprodução das teleóginas até 40 dias após o tratamento e reduz em 100% a oviposição e eclodibilidade dos ovos entre 7 e 27 dias após o tratamento. Pode ser usado em bovinos a partir de 12 meses de idade.

INDICAÇÕES:

FIPROLINE DUO[®] tem indicação mosquicida para mosca dos chifres (*Haematobia irritans*) e mosca dos estábulos (*Stomoxys calcitrans*), bernicida (larvas da mosca *Deratobia hominis*) e carrapaticida (*Rhipicephalus microplus*). Indicado também para prevenção e tratamento de miases decorrentes de infestações por larvas da mosca *Cochliomyia hominivorax*.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Administrar FIPROLINE DUO[®] em bovinos, através de aplicação tópica, para o tratamento e controle de infestações causadas por:

- Mosca dos chifres (*Haematobia irritans*) e carrapatos (*Rhipicephalus microplus*): dose única, pour-on (em todo o dorso do animal - fio do lombo), 1 mg de fipronil/kg PV, que corresponde a 1 mL de FIPROLINE DUO[®]/30 kg de peso vivo.
- Mosca dos estábulos (*Stomoxys calcitrans*), bernes (larvas da mosca *Deratobia hominis*) e de miases decorrentes de infestações por larvas da mosca *Cochliomyia hominivorax*: dose única, spot-on, (único ponto, preferencialmente na região dorso-cervical - região da cruz), 2 mg de fipronil/kg PV, que corresponde a 2 mL de FIPROLINE DUO[®]/30 kg de peso vivo.

Peso corporal (kg)	1,0 mg de fipronil/kg	2,0 mg de fipronil/kg
	Volume (mL)	Volume (mL)
<30	1	2
60	2	4
90	3	6
120	4	8
150	5	10
210	7	14
270	9	18
330	11	22
390	13	26
450	15	30
510	17	34

INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES:

- Estudos realizados com o produto demonstraram que as eficácias mosquicidas perduram por até 35 dias, a bernicida por até 28 dias e a carrapaticida por até 23 dias após o tratamento.

ADVERTÊNCIAS:

- Produto não recomendado para vacas produtoras de leite para consumo humano;
- Não utilizar em animais sensíveis ao fipronil;

- A segurança do FIPROLINE DUO[®] não foi avaliada em animais em atividade reprodutiva, gestantes e lactantes;
- A eficácia do produto não foi testada em animais molhados ou banhados logo após a aplicação.

REAÇÕES ADVERSAS:

- Reações de hipersensibilidade individual podem ocorrer. Para esses casos, indica-se o tratamento sintomático e não tratar novamente o animal com o produto
- Em caso de reações adversas, informe imediatamente ao médico-veterinário.

PRECAUÇÕES:

- Obedecer às dosagens e recomendações de uso do produto;
- Usar somente em bovinos;
- Não aplicar em dias chuvosos;
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto;
- Lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário;
- Aplicar o produto conforme indicado na bula;
- Utilizar com cautela em animais debilitados, idosos

ou enfermos;

- Ao manipular o produto, usar equipamento de proteção individual adequado (luvas, máscara, macacão);
- Tóxico para peixes e invertebrados aquáticos;
- Não armazenar ou aplicar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou domésticos;
- Não reutilizar as embalagens vazias e descartá-las conforme legislação vigente, para evitar a contaminação do meio ambiente;
- Evitar contato com pele, olhos, mucosas e boca e a inalação do produto.
- Em caso de contato com pele e olhos, recomenda-se lavar com água corrente em abundância. Caso a irritação persista, consulte um médico levando a bula do produto. Em caso de ingestão acidental, deve-se procurar um médico levando consigo a bula do produto. É possível que o vômito ocorra espontaneamente, não devendo ser evitado; neste caso, deitar o paciente em decúbito lateral para evitar que aspire o resíduo.

• **Nota para o médico:** Em caso de ingestão, a intoxicação pode ser reduzida provocando vômito em até meia hora da exposição. O tratamento da intoxicação deve ser sintomático e, nos casos graves, até que o paciente se estabilize. Considerando o mecanismo de ação do fipronil, é aconselhável evitar medicamentos que estimulem o efeito GABA, tais como barbitúricos, benzodiazepínicos e ácido valpróico. Não há antídoto conhecido.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 67 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: PRODUTO NÃO INDICADO PARA BOVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

APRESENTAÇÕES:

Frasco de plástico contendo 250 mL ou 1 L e galões de 5 L.

PRAZO DE VALIDADE:

24 meses. Após aberto, usar todo o conteúdo do frasco em até 6 meses.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário. Conservar em local seco, ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Cuidado  Veneno

Licenciado pelo MAPA sob o número SP 000129-0.000034 em 26/09/2023.

Responsável Técnico: Dra. Janaina Carlstron – CRMV/SP nº 21.555

Proprietário:

Sespo Indústria e Comércio Ltda.

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale

Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Paulínia/SP

CEP: 13148-115 — CNPJ: 50.464.692/0001-05

Fabricantes:

Sespo Indústria e Comércio Ltda.

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale

Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Paulínia/SP

CEP: 13148-115 — CNPJ: 50.464.692/0001-05

IPANEMA Ind. Prod. Veterinários LTDA.

Rod. Raposo Tavares, KM 113 – Barreiro

Araçoiaba da Serra/SP

CNPJ: 64.687.015/0001-52

