

MODIFIC[®]
CEVA

CEVA
MODFIC®

SOLUÇÃO INJETÁVEL DE AMINOÁCIDOS E SAIS MINERAIS PARA BOVINOS

USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS:
ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.
LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

REAÇÕES ADVERSAS:

Embora muito raramente, poderão ocorrer casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Recomenda-se cautela quando da administração em animais hipersensíveis aos componentes do produto. Caso ocorram eventos adversos persistentes ou de maior intensidade, o veterinário deverá ser consultado.

PRECAUCÕES GERAIS:

- Ler a bula atentamente e seguir as suas recomendações antes de usar o produto;
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto;
- Utilizar luvas para manipular o produto;
- Lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário;
- Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica;
- Não reutilizar as embalagens vazias e descartá-las conforme legislação vigente, para evitar a contaminação do meio ambiente;
- Pessoas com hipersensibilidade conhecida aos componentes ativos da fórmula devem evitar o contato com o produto veterinário;
- Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido.

PRAZO DE VALIDADE:

2 anos a partir da data de fabricação.
Após a abertura do frasco, utilizar todo o produto em até 90 dias

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE, ENTRE 15 °C E 30 °C.

Licenciado pelo MAPA desde 13/04/2023.
Registrado sob o número SP 000129-0.000021

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Dra. Janaína Carlstron
CRMV-SP n.º 21.555.

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Paulínia/SP
CEP: 13148-115 — CNPJ: 50.464.692/0001-05



P11111SY01



Contém:
1 frasco com 500 mL



MODFIC®

SOLUÇÃO INJETÁVEL DE AMINOÁCIDOS E SAIS MINERAIS PARA BOVINOS

USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS:
ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.
LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Contém:
1 frasco com 500 mL



FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:	
Cloridrato de L-Lisina	1,000 g
DL Metionina	0,210 g
Cloridrato de L-Arginina	0,200 g
Cloridrato de L-Histidina	0,210 g
Glicina	0,210 g
L-Valina	0,200 g
Glicina	0,420 g
Monoglutamato de sódio	0,420 g
Sulfato de Cobre	0,002 g
Iodeto de Potássio	0,015 g
Cloreto de Cobalto	0,013 g
Cloreto de Zinco	0,010 g
Cloreto de Magnésio	0,210 g
Hipofosfito de Cálcio	1,500 g
Excipientes (q.s.p.)	100 mL

DESCRIÇÃO:

CEVA MODIFIC[®] é uma solução injetável composta por aminoácidos (valina, leucina, histidina, glicina, lisina, metionina, arginina e monoglutamato de sódio - fonte de ácido glutâmico) e minerais (cloro, fósforo, iodo, potássio, cobalto, zinco, magnésio, cobre e cálcio).
Atua como suplemento de aminoácidos e minerais nas deficiências nutricionais de bovinos.

INDICAÇÕES:

CEVA MODIFIC® é indicado para bovinos, a partir dos 4 meses de idade, como suplemento para auxiliar na prevenção e tratamento dos desequilíbrios metabólicos e nutricionais relacionados aos componentes da fórmula do produto.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Posologia: Dose única de 10 mL por animal.
Modo de usar: CEVA MODIFIC® deve ser aplicado pela via subcutânea na região do pescoço.

ADVERTÊNCIAS:

- Não utilizar o produto em animais sensíveis ao(s) princípio(s) ativo(s) da fórmula;
- Não misturar o produto na mesma seringa com outros medicamentos;
- Não foram realizados estudos que comprovem a segurança do produto em animais com idade inferior a 4 meses de idade.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

Deve ser utilizado com cautela em animais com insuficiência renal, doença pancreática, insuficiência hepática, acidose preexistente, cálculos de urato, lesão miocárdica ou bloqueio cardíaco.

PART.:

FABR.:

VENC: