

# NIGLUMINE



**ANTI-INFLAMATÓRIO A BASE DE FLUNIXINA  
MEGLUMINA, PARA USO INJETÁVEL EM BOVINOS E  
EQUINOS**

## USO VETERINÁRIO

### FÓRMULA:

Flunixina Meglumina ..... 8,29 g\*  
Excipientes q.s.p. .... 100,00 mL  
\*Equivalente a 5g de flunixina

### DESCRIÇÃO E INDICAÇÕES:

**Niglumine** é uma solução injetável à base de flunixina meglumina, um potente anti-inflamatório não-esteróide, indicado para o tratamento de processos inflamatórios associados a dor e/ou febre em bovinos e equinos.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR:

A posologia do **Niglumine** deve seguir as indicações para cada espécie, que estão descritas na tabela abaixo:

Bovinos	1 mL para cada 22,5 kg de peso, por via intramuscular. Repetir se for necessário, com intervalos de 24 horas, por no máximo 5 dias consecutivos.
Equinos	Dose única de 1 mL para cada 45 kg de peso vivo, por via intramuscular. Repetir se for necessário, com intervalos de 24 horas, por no máximo 5 dias consecutivos.

### CONTRAINDICAÇÕES:

Não administrar a animais com histórico de hipersensibilidade à flunixina meglumina.

### INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Não associar ou usar concomitantemente com outros anti-inflamatórios não-esteróides, glicocorticóides ou diuréticos. Não são conhecidas, portanto os pacientes que requeiram uma terapia conjunta com outros fármacos devem ser monitorados para detectar possíveis interações.

### REAÇÕES ADVERSAS:

**Niglumine** mostrou-se seguro em bovinos e equinos. Caso ocorram eventos adversos persistentes ou de maior intensidade, o médico-veterinário deverá ser consultado.

### ADVERTÊNCIAS:

- A causa da inflamação, da dor ou da cólica deve ser determinada e tratada paralelamente com terapia adequada;
- Não realizar injeção intra-arterial a equinos, já que estes reagem com ataxia, incoordenação, hiperventilação, histeria e debilidade muscular;
- Deverão ser tomadas precauções na administração a bezerros e, caso ocorram sintomas de desidratação, deverá ser feito tratamento de fluidoterapia;
- Não utilizar durante a gestação. Não foram realizados estudos em animais gestantes.

### PRECAUÇÕES GERAIS:

- Ler a bula atentamente antes de usar o produto e não exceder a dose recomendada;
- Não misturar outras substâncias na mesma seringa;
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto;
- Evitar o contato com a pele, os olhos e boca. Utilizar luvas ao manipular o produto. Em caso de contato acidental com o produto, lavar abundantemente com água corrente. Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito e consultar o médico levando consigo a bula do produto;
- Lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário;
- Pessoas com hipersensibilidade conhecida aos componentes ativos da fórmula devem evitar o contato com o produto veterinário;
- Não utilizar o produto com prazo de validade vencido;
- Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica;
- Não reutilizar as embalagens vazias e descartá-las conforme legislação vigente, para evitar a contaminação do meio ambiente.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

### **ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA**

#### **BOVINOS:**

**ABATE:** O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 20 dias após a última aplicação.

**LEITE:** O leite dos animais tratados com este produto não deve ser destinado ao consumo humano até 1 dia após a última aplicação.

#### **EQUINOS:**

**ABATE:** Este produto não deve ser aplicado em equinos destinados ao abate para consumo humano.

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

## APRESENTAÇÕES:

Frascos de vidro contendo 50 mL e 100 mL.

## PRAZO DE VALIDADE:

Dois (02) anos após a data de fabricação do produto.  
Após aberto, utilizar todo o conteúdo do frasco em até 30 dias.

## VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

## MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

## CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE, ENTRE 15 °C E 30 °C.

Licenciado no MAPA sob nº 6.670 em 11/01/1999.

**Responsável Técnico:** Gustavo Montaldi Carvalho  
CRMV/MG n.º 13.060.

## Proprietário:

### **CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA**

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale  
Rod. MG 050, nº 2001 - Distrito Industrial  
Juatuba/MG - CEP: 35675-000  
CNPJ: 07.086.487/0001-16

## Fabricante:

### **SESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale Ltda.  
Rua Manoel Joaquim Filho, nº 303  
CEP: 13148-115 - Paulínia/SP  
CNPJ: 50.464.692/0001-05

