



PECUÁRIA

2026

ATACADO

NOSSOS VALORES

Acreditamos na paixão pelo cliente, moldando cada solução e a forma como trabalhamos em torno das ambições, das necessidades e dos desafios específicos de cada cliente. Nós construímos relacionamentos fortes e de longo prazo, trabalhando como parceiros, inovando e desenvolvendo novas soluções em conjunto.

Nosso espírito empreendedor incentiva nossos colaboradores, cientistas e parceiros a criar soluções para melhorar nosso conhecimento sobre a saúde animal. Nós compartilhamos conhecimentos e aproveitamos as oportunidades. Nós pensamos e buscamos fazer com criatividade. Tudo para encontrar a melhor solução possível para os nossos clientes.

Nosso conceito de inovação nos mantém focados em pensar e agir buscando a melhoria contínua e alta qualidade. Não é apenas sobre inovação de produtos, mas em nos desafiar constantemente para encontrar novas formas de criar valor a longo prazo - para nós e para os nossos clientes.

A solidariedade é o trabalho em equipe. E nosso objetivo é superar os desafios da saúde animal em todo o mundo. Nossos colaboradores têm liberdade para tomar as decisões e respeitam o trabalho um do outro. Isso se estende aos nossos clientes, com os quais nós estabelecemos um relacionamento aberto e colaborativo.

ANTIBIÓTICOS

Partomicina®	05
Tyladen®	06

ANTI-INFLAMATÓRIOS

Dexacort®	07
Equipalazone® injetável	08
Equipalazone® oral	09
NGF-5® +	10
Niglumine®	11
Retardoesteróide®	12

ECTOPARASITICIDAS

Combo® Pour On	13
Cyperclor® Plus Pulverização	14
Fiproline DUO®	15



VERMÍFUGOS

Padock® Gel	16
Padock® Plus NF	17

VACINAS

Anavac® B19	18
Garrotilho®	19
Rabmune®	20

SUPLEMENTOS

ADE Injetável Corte & Leite®	21
MODFIC®	22
Roboforte® Injetável	23

HORMÔNIOS PARA REPRODUÇÃO

Fertcor®	24
----------	----

SEDATIVOS

Anasedan®	25
Dopalen®	25



Antibióticos



PARTOMICINA®

Associação antibiótica bactericida com mioconstritor uterino e anti-hemorrágico indicada para tratamento da retenção de placenta e infecções uterinas.

Formulação

Cada frasco com pó contém:

- Penicilina G Sódica 2.000.000 UI + Penicilina G Clemizolo 2.000.000 UI + Sulfato de Di-hidroestreptomicina 3,09 g (equivalente a 3,86 mg de di-hidroestreptomicina)
- + Maleato de Ergometrina 0,005 g
- + Vitamina K3 0,72 g

Cada frasco com 20 mL de diluente contém:

- Difilina 1,050 g

Apresentações | 1 frasco contendo 7,91 g pó + 1 frasco com 20 mL de diluente estéril

Instruções

Inserir o diluente no frasco com o pó. Homogeneizar (misturar) completamente e aplicar por via intramuscular profunda na dose de 20 mL/vaca. Repetir o tratamento após 24 horas ou a critério do médico-veterinário. Utilizar todo o conteúdo imediatamente após a homogeneização.

Carência

- Leite: 8 dias.
- Abate: 41 dias.

Benefícios

- Facilita o descolamento e a expulsão da placenta retida
- Níveis adequados de antibióticos bactericidas no ambiente intrauterino
- Previne e trata infecções uterinas
- Acelera a involução uterina
- Ajuda no controle de hemorragias intrauterinas

Período de validade

24 meses. Utilizar todo o conteúdo imediatamente após a diluição.





TYLADEN®

Antimicrobiano para uso em bovinos, suínos e caprinos. Indicado para tratamento de doenças respiratórias, infecções dos pés e cascos, infecções uterinas, infecções das articulações, mastites causadas por microrganismos sensíveis a tilosina.

Formulação | Tilosina 20%

Apresentações | Frascos com 50 mL e 100 mL

Instruções

Aplicar 1 mL/20 kg p.v. diariamente, por via intramuscular profunda. Nos bovinos o tratamento deverá ser realizado por no mínimo 3 dias consecutivos. Nos suínos e caprinos o tratamento deverá ser realizado por no máximo 3 dias.

Carência

Bovinos e caprinos

- Abate: 21 dias após a última aplicação.
- Leite: 4 dias após a última aplicação.

Suínos

- Abate: 21 dias após a última aplicação.

Benefícios

- Atinge rapidamente o pico plasmático e altas concentrações nos tecidos alvo.
- Fácil aplicação.

Período de validade

24 meses.

Anti-inflamatórios



DEXACORT®

Anti-inflamatório injetável com ação antialérgica. Como antiflogístico é indicado nas inflamações localizadas nas articulações e estruturas acessórias: reumatismos, artrites, poliartrites e demais síndromes dolorosas, nervosas ou musculares. É recomendado em reações alérgicas, pruridos, eczemas não específicos e anafilaxias.

Formulação | Dexametasona (fosfato de sódio) 0,25%

Apresentações | Frascos de 10 mL e 50 mL

Instruções

Aplicar as seguintes doses e pelas vias indicadas, conforme a espécie animal.

- Equinos e bovinos adultos: 2 a 4 mL, por via intramuscular ou endovenosa.
- Potros e bezerros: 1 a 2 mL, por via intramuscular ou endovenosa.

O médico-veterinário pode determinar o esquema posológico mais adequado.

Carência

- Bovinos
Leite: não deve ser utilizado em fêmeas produtoras de leite para consumo humano.
Abate: 21 dias.
- Equinos
Não administrar em animais destinados ao consumo humano.

Benefícios

- Potente anti-inflamatório à base de dexametasona com alta concentração (0,25%).

Período de validade

24 meses.



EQUIPALAZONE® INJETÁVEL

Anti-inflamatório não esteroidal para tratamento de inflamações das articulações, tendões e ligamentos e afecções reumáticas, articulares e musculares, possuindo também efeito antipirético e analgésico.



LÍDER EM FENILBUTAZONA

Formulação | Cada 100 mL contém 20 g de Fenilbutazona

Apresentações | Frascos de 100 mL

Instruções

Aplicar exclusivamente pela via endovenosa lenta.

· Equinos: 1 a 2 mL para cada 100 kg p.v., correspondente a 2,2 a 4,4 mg de fenilbutazona/ kg p.v. a cada 24 ou 48 horas. A duração do tratamento é a critério do médico-veterinário.

Carência

· Equinos: Não administrar em animais destinados ao consumo humano.

Benefícios

· Equipalazone tem potência comprovada como anti-inflamatório, antipirético e analgésico.

Período de validade

24 meses.



EQUIPALAZONE® ORAL

A fenilbutazona constitui a medicação de escolha em todas as afecções reumáticas, articulares, musculares tendinosas, inflamatórias ou nos estados febris, muito frequentes em cavalos de esportes.

**MAIS SEGURANÇA
NA APLICAÇÃO**

Formulação | Cada 1,08 g (1 envelope) do produto contém:

Fenilbutazona 1,0 g

Excipiente 0,08 g

Apresentações | Embalagem com 100 sachês de 1g cada

Instruções

Administrar por via oral, adicionando ao alimento 1 a 2 envelopes para cada 250 kg de peso vivo, durante 3 a 4 dias consecutivos. Se necessário, administrar durante 4 dias com uma dose de manutenção, a metade da terapêutica.

Carência

· Equinos: não administrar em animais destinados ao consumo humano.

Benefícios

· Poder anti-inflamatório da fenilbutazona para ser fornecido por via oral, sem precisar experiência na aplicação na veia.

Período de validade

24 meses.



NGF-5+®

NGF-5+® é indicado como anti-inflamatório de uso tópico em equinos e também atua no controle da dor em afecções músculo-esqueléticas e de tecidos moles.



Formulação | Cada 100 g contém:

Cada 100g contém:

Diclofenaco de dietilamônio 1,500g

Excipiente q.s.p. 100,0g

Contém mentol e gel hidro-alcóolico

Apresentações | Bisnaga de 100 g e pote de 450g.

Instruções

Aplicar uma fina camada de **NGF-5+®** e massagear suavemente, espalhando o produto em toda a área a ser tratada, duas vezes ao dia, por 7 a 10 dias.

Aplicar somente sobre a pele intacta, sem feridas abertas ou escoriações;

Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida ao princípio ativo do produto;

A segurança do produto não foi avaliada em fêmeas prenhes/lactantes.

Carência

Equinos: este produto não deve ser aplicado em equinos produtores de carne para consumo humano.

Benefícios

Alta absorção (gel hidroalcoólico) e alta concentração de diclofenaco dietilamônio.

Período de validade

2 (dois) anos após a data de fabricação.

Após abertura da embalagem, utilizar todo o produto em até 60 (sessenta) dias.





NIGLUMINE®

Para bovinos: no tratamento da inflamação aguda.

Para equinos: no tratamento de dores viscerais associadas à cólica. No tratamento de inflamações e dores associadas com alterações musculoesqueléticas.

Formulação | Cada 100 mL contém:

Flunixin meglumina 8,29 g (*)

Excipiente q.s.p. 100,0 mL

* Equivalente a 5 g de flunixinina

Apresentações | Frascos de 50 mL e 100 mL

Instruções

Bovinos: 1mL/22,5 kg ou 4 mL/100 Kg p.v., pela via intramuscular. Caso necessário, repetir aplicação a intervalos de 24 horas, não excedendo 5 dias consecutivos.

Equinos: 1mL/45 kg de p.v., pela via intramuscular.

- Cólicas: um tratamento logo no início dos sintomas. Caso reapareçam os sintomas repetir mais 1 ou 2 vezes.
- Inflamações e dores associadas a alterações musculoesqueléticas: 1 aplicação ao dia, não excedendo 5 dias consecutivos.
- Não aplicar em equinos que irão participar de competições.

Carência

Bovinos

- Abate: 20 dias
- Leite: 1 dia

Equinos

- Abate: não aplicar em equinos que se destinam aos consumo humano.

Benefícios

- Potente efeito analgésico nas dores viscerais e associadas a afecções dos tecidos moles.

Período de validade

36 meses.



RETARDOESTERÓIDE®

Anti-inflamatório esteroidal indicado para uso em equinos, nas inflamações, alergias e traumatismos.

Formulação | Cada 100 mL contém
Acetonido de Triancinolona 0,2 g

Apresentações | Frascos de 50 mL

Instruções

Agitar o frasco antes de usar e aplicar:

Por via intra-articular aplicar de 3 a 9 mL em dose única.

Carência

· Equinos

Não administrar em animais destinados ao consumo humano.

Benefícios

· Anti-inflamatório a base de Triancinolona em dose única.

Período de validade

24 meses.

Ectoparasiticidas



COMBO® POUR ON

Produto carrapaticida, mosquicida e berricida pronto para uso em bovinos.

Formulação | Cipermetrina 5% + Clorpirifós 7% + Butóxido de Piperonila 1%

Apresentações | Frascos dosadores com 1 L e galões de 5 L

Instruções

Aplicar diretamente sobre a linha média superior do corpo ("fio do lombo") entre a base da nuca e a base da cauda, na dose de 10 mL/100 kg p.v. A dosagem máxima recomendada para animais com mais de 600 kg de p.v. é de 60 mL. Não aplicar em: animais jovens, doentes, debilitados, sedentos ou muito estressados; fêmeas no terço final da gestação; sobre áreas de pele com ferimentos ou cobertas de lama ou esterco; em horários de calor intenso; em dias chuvosos. Caso ocorram chuvas até 24 horas após o tratamento, recomenda-se repetir o mesmo. Não aplicar junto a outros organofosforados e/ou carbamatos, relaxantes musculares e tranquilizantes.

Carência

- Leite: não usar em fêmeas produtoras de leite para consumo humano.
- Abate: 74 dias.

Benefícios

- Controle fácil e eficiente de importantes ectoparasitos dos bovinos em um único produto.
- Formulação com agente sinergista da cipermetrina, facilitando o controle das cepas de ectoparasitos resistentes a este ativo.
- Baixo período de carência.

Período de validade

24 meses. Utilizar todo o conteúdo em até 6 meses após a abertura do frasco.





CYPERCLOR® PLUS PULVERIZAÇÃO

Carrapaticida, mosquicida e bernicida em concentrado emulsionável para uso em bovinos após a diluição na água.

Formulação | Cipermetrina 15% + Clorpirifós 25% + Butóxido de Piperonila 15%.

Apresentações | Frascos com 1 L

Instruções

Diluir em água limpa 1 parte de produto em 800 partes de água (1 litro/800 litros de água ou 25 mL/20 litros d'água). Realizar a pré-diluição antes da obtenção da mistura total final, homogeneizando a quantidade desejada do produto em pequeno volume de água (por exemplo: 25 mL/0,5 L de água) e posteriormente completar o volume total final da mistura. Após a preparação da calda, aplicar 4 L a 5 L da mesma sobre todo o corpo do animal. Utilizar pulverizador com pressão adequada e bico em leque. Pulverizar a calda preparada sempre no sentido inverso aos pelos (contra os pelos), procurando atingir a pele. Não utilizar em: animais jovens (menos que 4 meses de idade); fêmeas prenhes; horas e dias muito quentes e de sol intenso; junto a outros organofosforados ou carbamatos.

Carência

- Leite: 2 dias.
- Abate: 8 dias.

Benefícios

- Alta eficácia no controle dos principais ectoparasitos dos bovinos.
- Rápido início no controle das infestações pelos principais ectoparasitos dos bovinos (efeito "knock down")
- Presença equilibrada de agente sinérgico na formulação, permitindo o controle de cepas do carrapato resistentes a piretróides.

Período de validade

24 meses. Após a abertura do frasco, utilizar em até 6 meses.





FIPROLINE DUO®

Fiproline Duo® é uma solução tópica, de aplicação pour-on e spot-on, que contém fipronil (3%) para controle de ectoparasitas em bovinos.

Formulação

Cada 100ml contém:

Fipronil 3 g
Veículo q.s.p. 100 mL

Apresentações | Frascos plásticos dosadores com 250 mL;

Instruções

- Aplicação pour on: aplicar sobre a linha média superior ("fio do lombo") a dose de 1mL/30 Kg p.v. (10mL/300 Kg p.v.). Não há dose máxima.
- Aplicação spot on: aplicar em um ponto da superfície corporal, preferencialmente logo após a paleta, a dose de 1 mL/15 Kg p.v.

Carência

ABATE: 67 dias para abate de bovinos tratados.

LEITE: produto não indicado para bovinos produtores de leite para consumo humano

Benefícios

- Controla as infestações pelos principais parasitos externos dos bovinos (carrapato, mosca dos chifres, bicheiras, berne e mosca dos estábulos)
- Trata 3 vezes mais animais pela via pour on, quando comparado a outros produtos com fipronil 1%.
- A menor carência para o abate dentre os produtos a base de fipronil 1%: 67 dias

Período de validade

24 meses. Após a abertura do frasco, utilizar em até 6 meses.



Vermífugos



PADOCK® GEL



Vermífugo indicado para controle das verminoses em equinos causadas pelos grandes e pequenos estrôngilos, *Oxyurus sp.*

Formulação | Cada 100 g contém 2 g de Ivermectina

Apresentações | Seringas plásticas graduadas de 6 g

Instruções

O produto deve ser administrado por via oral na proporção de 0,2 mg de ivermectina por kg p.v., ou seja, deve-se fornecer o ajuste do êmbolo da seringa de acordo com o peso do animal.

Carência

· Equinos: não administrar em animais destinados ao consumo humano.

Benefícios

· Vermífugo para equinos, muares e asininos. Éguas prenhes e potros em lactação.

Período de validade

24 meses.



**VERMÍFUGO
COMPOSTO**

PADDOCK® PLUS NF

Vermífugo de amplo espectro para controle das verminoses em equinos. A associação entre ivermectina e praziquantel tem ação muito eficaz no controle de endoparasitoses, incluindo as causadas por tênia.

Formulação | Cada 100 g contém 2 g de Ivermectina e 25 g de Praziquantel

Apresentações | Seringas plásticas graduadas de 6 g

Instruções

O produto deve ser administrado por via oral na proporção de 1g para cada 100 kg p.v., ou seja, deve-se fornecer o ajuste do êmbolo da seringa de acordo com o peso do animal.

Carência

· Equinos: não administrar em animais destinados ao consumo humano.

Benefícios

· Vermífugo para equinos, muares e asininos. 1 seringa trata 600kg de peso vivo.

Período de validade

24 meses.



Vacinas



ANAVAC® B19

Vacina para prevenção da Brucelose Bovina.



Formulação | Suspensão liofilizada da *Brucella abortus* Cepa B 19

Apresentações | Frascos com liofilizado + Frasco com diluente de 30 mL (15 doses)

Instruções

Manter sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). A vacina só deve ser aplicada nas bezerras (terneiras) entre 3 e 8 meses de idade. A vacinação deverá ser realizada pelo médico-veterinário habilitado ou por pessoa autorizada por ele. Após a reconstituição e homogeneização do liofilizado no diluente, aplicar 2 mL por via subcutânea. Utilizar logo após a preparação. Não reutilizar sobras da vacina que deverão ser descartadas de maneira adequada. Não vacinar animais doentes, debilitados ou sob estresse extremo. Não realizar tratamentos antimicrobianos pré e pós-vacinação ou conforme orientação do médico-veterinário.

Carência

- Leite: ZERO dias.
- Abate: ZERO dias.

Benefícios

- Prevenção da brucelose bovina.
- Vacina obrigatória de acordo com o PNCEBT (Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Período de validade

12 meses.





GARROTILHO®

Prevenção do garrotilho (adenite infecciosa) dos equinos.

Formulação | Suspensão de *Streptococcus* equi em soro fisiológico

Apresentações | Frasco com 10 doses

Instruções

Manter sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). Deve ser administrada por via intramuscular após assepsia local. Animais sadios não vacinados previamente devem receber três doses de 2 mL da vacina, intervaladas de 2 a 4 semanas. A revacinação com uma dose deve ser realizada anualmente.

Carência

· Equinos: não administrar em animais destinados ao consumo humano.

Benefícios

· Prevenção contra garrotilho, uma doença altamente contagiosa.

Período de validade

18 meses.



RABMUNE®

Vacina para prevenção da raiva dos bovinos, equinos, ovinos e caprinos.

Formulação | Suspensão do vírus rábico PV inativado

Apresentações | Frascos com 25 doses

Instruções

Manter sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). Não congelar. Agitar o frasco antes de usar. Aplicar por via subcutânea ou intramuscular a dose de 2 mL por animal. Em animais jovens a 1ª dose deve ser aplicada a partir dos 3 meses de idade ou antes disso a critério do médico-veterinário, repetindo-se outra dose 30 dias após. Em animais adultos sem histórico de vacinação contra a Raiva ou que nunca receberam a vacinação (animais de compra ou recém-chegados em área de risco), aplicar uma dose e repetir outra dose 30 dias após. Revacinação a cada 12 meses ou de acordo com a recomendação do médico-veterinário ou programa oficial da autoridade sanitária local. Não vacinar animais doentes, debilitados ou sob estresse extremo. Em equinos deve-se aplicar por via intramuscular.

Carência

- Leite: ZERO dias,
- Abate: ZERO dias.

Benefícios

- Proteção contra a raiva dos herbívoros.
- Multiespécies, indicada para bovinos, eqüídeos, ovinos e caprinos.

Período de validade

24 meses.



Suplementos



ADE INJETÁVEL CORTE & LEITE®

Produto indicado para o tratamento de carência das vitaminas A, D e E. Através da suplementação vitamínica, favorece a conversão alimentar, a fertilidade, o aumento da resistência às infecções e o aumento da produtividade leiteira. Como estimulante, acelera a recuperação dos animais em convalescença.

Formulação | Cada 100 mL contém:

- Retinol (Vitamina A1)..... 2.500.000 UI
- Calciferol (Vitamina D3) 500.000 UI
- Tocoferol (Vitamina E) 1.650.000 UI

Apresentações | Frascos com 100 mL e 50 mL.

Instruções

Produto pronto para uso, devendo ser aplicado por via intramuscular profunda com doses repetidas a cada 2, 4 ou 6 semanas, de acordo com a recomendação do médico-veterinário. As seguintes doses são recomendadas:

- Bezerros: 2 a 5 mL.
- Bovinos em recria e engorda: 5 a 10 mL.
- Vacas em gestação e lactação: 5 a 10 mL.
- Ovinos: 1 a 3 mL.

Não injetar mais que 10 mL por ponto de aplicação. Utilizar todo o conteúdo após a abertura do frasco.

Carência

- Leite: ZERO dias.
- Abate: ZERO dias.

Benefícios

- Possibilita a correção de carências das Vitaminas A, D e E em fases críticas em termos nutricionais (período das secas, por exemplo).
- Permite a aceleração da retomada dos níveis de ganho de peso após períodos críticos do ano (secas, por exemplo).
- Ajuda na recuperação de animais convalescentes.

Período de validade

24 meses. Após aberto, consumir todo o conteúdo do frasco.





MODFIC®

MODFIC® é uma solução injetável composta por aminoácidos e minerais. Atua como suplemento de aminoácidos e minerais nas deficiências nutricionais de bovinos. MODFIC® pode ser administrado em casos de distúrbios do metabolismo causados pela desnutrição, e até mesmo como revitalizante e

estimulante orgânico para a melhora da condição nutricional dos animais. MODFIC® é indicado como auxiliar na prevenção e tratamento de desequilíbrios metabólicos e nutricionais associados aos componentes da fórmula.

Formulação | Cada 100 mL contém:

Cloridrato de L-Lisina.....	1,0 g
DL Metionina.....	0,210 g
Cloridrato de L-Arginina.....	0,200 g
Cloridrato de L-Histidina.....	0,210 g
L-Leucina.....	0,210 g
L-Valina.....	0,200 g
Glicina.....	0,420 g
Monoglutamato de sódio.....	0,420 g
Sulfato de Cobre.....	0,002 g
Iodeto de Potássio.....	0,015 g
Cloreto de Cobalto.....	0,013 g
Cloreto de Zinco.....	0,010 g
Cloreto de Magnésio.....	0,210 g
Hipofosfito de Cálcio.....	1,500 g

Apresentações

Frascos de 500 mL

Instruções

Administrar a partir dos 4 meses de idade, em dose única de 10 mL por animal, aplicado por via subcutânea, na região do pescoço.

Carência

- Leite: ZERO dias.
- Abate: ZERO dias.

Benefícios

- Os componentes de Modfic, 8 aminoácidos + 10 minerais, participam de processos fundamentais para ativação do metabolismo orgânico, à defesa contra infecções, aos processos de desenvolvimento corporal, produção de hormônios, reprodução e funcionamento do sistema nervoso central.
- Reconstituente e revigorante em situações de desafio nutricional e que exijam geração de energia.

Período de validade

24 meses. Após a abertura do frasco, utilizar todo o seu conteúdo em até 90 dias.





ROBOFORTE® INJETÁVEL

Suplemento nutricional injetável de alto valor biológico indicado como ativador metabólico/energético. É indicado em situações de desequilíbrio metabólico e/ou energético dos bovinos e equinos, e na adaptação de novas dietas. Fonte de aminoácidos, cálcio, fósforo e colina, uma vitamina de alto valor nos processos metabólicos.

Formulação

Hidrolisado de caseína 5%, fonte dos aminoácidos: Arginina, Fenilalanina, Isoleucina, Histidina, Leucina, Lisina, Metionina, Treonina, Triptofano, Valina, Ácido aspártico, Ácido glutâmico, Alanina, Cisteína, Glicina, Prolina, Serina, Tirosina + Cálcio fosforilcloreto de colina 5%, fonte de cálcio, fósforo e colina.

Apresentações | Frascos com 250mL.

Instruções

Bovinos: 1 mL/20 Kg p.v. pelas vias subcutânea ou intravenosa lenta. A partir de 2 dias de idade.
Equinos: 1 mL/20 Kg p.v. por via intramuscular. A partir de 12 meses (1 ano) de idade.
Os tratamentos poderão ser repetidos conforme indicação do médico veterinário.

Carência

- Leite: ZERO dias.
- Abate: ZERO dias.

Benefícios

- Suplemento nutricional injetável que fornece energia e acelera o metabolismo
- Auxilia o sistema imune e na adaptação de novas dietas, além de ajudar na recuperação de enfermidades.
- Exclusiva formulação equilibrada contendo 18 dos 20 aminoácidos, sendo todos os 10 essenciais, além de cálcio, fósforo e colina.

Período de validade

- 24 meses após a data de fabricação.
- 3 meses após a abertura do frasco.

Hormônios Para Reprodução



FERTCOR®



Fêmeas: para induzir a ovulação, no caso de estro prolongado ou cio silencioso ou associado ao FSH para indução do estro. Para induzir a luteinização do folículo e manutenção do corpo lúteo, no caso de subfertilidade devido à função luteínica insuficiente e no caso de cisto ovariano, associado ou não à ninfomania.

Machos: no caso de produção insuficiente de testosterona por parte do testículo, com consequente diminuição da libido e nos casos de criptorquidismo.

Formulação

Gonadotrofina Coriônica humana (hCG).....	5000 U.I.
Excipientes q.s.p.	20,00 mg

Cada frasco de diluente contém:

Cloreto de sódio	18,00 mg
Excipientes q.s.p.	2,00 mL

Apresentações | Cartucho contendo 2 frascos com liofilizado, acompanhados de 2 frascos com diluente.

Carência

• Equinos: não administrar em animais destinados ao consumo humano.

Benefícios

Fertcor é precisão na ovulação das éguas para sincronizar receptora e doadora na transferência de embriões em equinos.

Alta precisão e eficácia na reprodução em éguas.

Fertcor é a base de hCG*, que atua no local exato da ovulação, deixando-a com mais precisão.

Fertcor é mais precisão e eficiência no uso do sêmen congelado na inseminação.

*Gonadotrofina Coriônica Humana.

Período de validade

36 meses.



Sedativos

Venda controlada.

Estes produtos têm venda sob prescrição do médico-veterinário, com retenção obrigatória da notificação de receita. Consulte o médico-veterinário ou a equipe Ceva para mais informações.



ANASEDAN®



Formulação | Xilazina 2%.

Benefícios

- Permite tranquilidade e precisão nas intervenções cirúrgicas e em práticas de manejo (transporte, pesagens, etc).



DOPALEN®



Formulação | Cloridrato de ketamina 11,6% = 10% de ketamina base.

Benefícios

- Auxilia na contenção e manejo de animais mais reativos.





rumigrantes.ceva.com.br

  **cevapecuariabrasil**

  **cevaequinosbr**

0800 770 0355 · sac@**ceva.com**