

# INDIGEST

## USO VETERINÁRIO



### Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Mebutona ..... 10,2 g  
Excipientes q.s.p. .... 100,0 mL

### Indicações principais:

Bovinos e equinos. Para aumentar as secreções biliares e pancreáticas.

### Indicações complementares:

Devido ao aumento destas secreções, **Indigest** poderá ser usado para tratamento de disfunções do trato gastrointestinal, tais como: constipação, diarreia, gastroenterites, insuficiência hepática, estresse hepatopancreático dos animais jovens em regime de engorda intensiva e timpanismo.

### Posologia:

Bovinos adultos: 20 mL a 40 mL

Bezerros: 5 mL a 15 mL

Equinos: 20 mL a 30 mL

### Modo de usar:

A via de administração mais prática é a intramuscular, sendo que a via intravenosa deve ser usada quando se pretende uma ação terapêutica rápida. Em equinos, o produto deve ser administrado por via intravenosa lentamente na jugular (cerca de 20 mL em 20 segundos).

### Duração do tratamento:

Injeção única, podendo ser repetida após 24 horas a critério do médico-veterinário.

### Interações medicamentosas:

**Indigest** não pode ser associado a soluções de cálcio e penicilina procaína injetáveis, mas pode vir a ser associado a preparações de diidroestreptomicina e vitamina A.

### Contraindicações:

Não administrar o produto em animais hipertérmicos (febres) e com problemas cardíacos.

### ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE

#### PERÍODOS DE CARÊNCIA:

##### BOVINOS:

**ABATE: CARÊNCIA ZERO.**

**LEITE: CARÊNCIA ZERO.**

**EQUINOS: ABATE: CARÊNCIA ZERO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

### Efeitos secundários:

Devido à alta concentração do **Indigest**, podem ocorrer os seguintes efeitos secundários no caso de aplicação inadequada:

- Uma injeção intravenosa rápida pode provocar um estado semelhante ao choque com hipertensão. O animal "cai de joelhos" mas normalmente levanta-se após alguns minutos. Portanto, lembre-se sempre: injeção intravenosa lenta.
- Quando se injetam grandes volumes (mais de 20 mL) num mesmo local, haverá atração de líquido tecidual circulante, acarretando risco de necrose. Quando se utiliza injeção intramuscular, a dose a ser aplicada não deve exceder 20 mL.
- A injeção de **Indigest** provoca, em muitos casos, o aumento da motilidade do estômago, micção e eliminação de excrementos (fezes) de coloração escura, ricos em sais biliares.

### Sobredosagem:

As doses indicadas de **Indigest** não devem ser aumentadas. Nos casos acidentais de superdosagem, administrar tônicos cardíacos.

### Apresentação:

Frasco-ampola de vidro contendo 30 mL.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

### VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado pelo MAPA desde 02/10/1996. Registrado sob o número MG 000022-0.000025.

### Proprietário:

Ceva Saúde Animal

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale

Rod. MG 050, nº 2001 - Distrito Industrial - Juatuba/MG

CEP: 35675-000 - CNPJ: 07.086.487/0001-16

### Fabricante:

SESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - CEP: 13148-115 - Paulínia/SP

CNPJ: 50.464.692/0001-05

### Responsável Técnico:

Gustavo Montaldi Carvalho

CRMV/MG 13.060

