



## FICHA TÉCNICA

### Neumoxina

#### SECCIÓN 1: información del producto

**Nombre Comercial del Producto:** NEUMOXINA.

**Clasificación farmacológica:** Antimicrobiano/ Antibiótico/ Macrólido.

**Forma Farmacéutica:** Solución inyectable.

**Especies indicadas:** Bovinos y porcinos.

**Vías de administración:** Bovinos: subcutánea/ Porcinos: intramuscular.

#### SECCIÓN 2: Composición

<i>Cada 100 ml contiene:</i>	
Tulatromicina	10,0 g
Excipientes c.s.p	100,0 ml

#### SECCION 3: Indicaciones

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio asociada a agentes bacterianos susceptibles a la tulatromicina.

Metafilaxia del complejo respiratorio bovino asociado a agentes sensibles a tulatromicina.

Tratamiento de la queratoconjuntivitis infecciosa bovina..

#### SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

##### CONTRAINDICACIONES DE USO:

- No utilizar en animales hipersensibles al principio activo o excipientes.
- No utilizar en caso de sensibilidad a antibióticos macrólidos. No utilizar simultáneamente con otros macrólidos o lincosamidas.

##### PRECAUCIONES DE USO:

- Administrar respetando las normas de asepsia.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Neumoxina

- En caso de utilizarse como metafilaxia, debe estar previamente establecida la presencia de la enfermedad en el rebaño.
- La administración puede causar manifestaciones de dolor.
- Evitar riesgo de autoinyecciones accidentales.

#### RESTRICCIONES:

- Tiempo de retiro pre-faena: 21 días en bovinos y 12 días en porcinos.
- Tiempo de retiro pre-ordeño: No administrar en animales productores de leche destinada al consumo humano.

#### SECCION 5: Especificaciones del producto

**Color:** Incoloro.

**Aspecto:** Solución límpida y cristalina.

#### SECCION 6: Presentaciones

Envase primario: Frasco ampolla multidosis por 20 y 50 ml.

Envase secundario: Caja de cartulina impresa con la información requerida.

#### SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

#### SECCION 8: Dosis y aplicación

Aplicar una única dosis de 1 ml cada 40 kg de peso (equivalente a 2,5 mg/kg) por vía subcutánea en bovinos e intramuscular en porcinos.

Dosis totales superiores a 10 ml en bovinos, y 2,5 ml en porcinos, deben aplicarse en grupos musculares diferentes.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Neumoxina

#### SECCION 9: Conservación

Conservar entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar directa, en lugar higiénico, manteniendo su envase original y sistema de seguridad intacto.

#### SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 21-055
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- El uso de este producto sin un diagnóstico correcto puede generar resistencia a los antimicrobianos. Se deberá respetar la dosis, intervalo y duración del tratamiento.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

**Camila O'Gorman 412, Piso 12°**

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*