zoovet®

ATB FENAC

5.000.000 U.I. / 10.000.000 U.I.

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

Penicilina sódica + Penicilina benzatínica
Estreptomicina + Diclofenac

ATB FENAC

Potente combinación farmacéutica capaz de revertir rápidamente, procesos infecciosos

ACCIÓN RÁPIDA
30 minutos luego de la aplicación

ACCIÓN DEPÓSITO
24-48 horas de biodisponibilidad

ACCIÓN AINE
Antiinflamatorio
Antifebril
Analgésico

Fórmula

ATB fenac 5.000.000 UI:
Cada frasco con polvo contiene: Penicilina G Benzatínica 2.500.000 UI (1,98 g), Penicilina G Sódica 2.500.000 UI (1,56 g), Estreptomicina 2 g.
Cada frasco con diluyente contiene:
Diclofenac sódico 1,25 g, Agua c.s.p. 20 ml.

ATB fenac 10.000.000 UI:
Cada frasco con polvo contiene:
Penicilina G Benzatínica 5.000.000 UI; Penicilina G Sódica 5.000.000 UI; Estreptomicina 4 g.
Cada frasco con diluyente contiene:
Diclofenac sódico 2,5 g, Agua c.s.p. 40 ml.

Indicaciones
Se trata de una formulación antimicrobiana de amplio espectro destinada a combatir infecciones mixtas causadas por bacterias gram positivas, aerobias y anaerobias, y gram negativas.
Presenta efectividad en el control de afecciones causadas por las siguientes bacterias: *Streptococcus penicilina lábiles; Staphylococcus penicilina lábiles; Corynebacterium pyogenes; Clostridium spp.; Erysipelothrix rhusiopathie; Actinomyces ovis; Leptospira spp; Pasteurella spp.; Escherichia coli y Campylobacter foetus.* Además cuenta con el accionar de un potente agente antiinflamatorio, analgésico y antipirético con poder bactericida, por lo cual mejora la actividad antibiótica.

Dosis y Modo de Uso
Diluya en forma aséptica el polvo mezcla de antimicrobianos con el diluyente del segundo frasco. Agitar antes de usar. Administrar 1ml cada 25 kg de peso vivo.
Esta dosis corresponde a la aplicación de:
- 10.000 UI de penicilina por kg de peso vivo.
- 4 mg de estreptomicina por kg de peso vivo.
- 2,5 mg de diclofenac por kg de peso vivo.

Repetir cada 24 a 48 horas, por tres aplicaciones. En caso de no remitir los síntomas replantear el diagnóstico y su tratamiento.

Vías de administración
Intramuscular profunda.

Contraindicaciones, precauciones y advertencias
Evite administrar en animales con historia de reacciones alérgicas o hipersensibilidad a los principios activos del producto.
No administrar a animales con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o úlceras gastrointestinales.
Utilizar jeringa y aguja estériles.
No destinar animales a faena para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.
No administrar en vacas en lactación cuya leche se destine a consumo humano o industrialización.

Bovinos · Equinos · Porcinos · Ovinos

zoovet®

Otros antibióticos Zoovet asociados con diclofenac

OXIFENAC® L.A.

Oxitetraciclina 20% - Diclofenac sódico 2,5%

- Antibiótico bacteriostático de larga acción
- Con la dosis exacta de diclofenac

ZIFLOR® FENAC

Florfenicol 30% - Diclofenac (diclofenaco) 3,75%

- Excelente opción en casos de resistencia bacteriana

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

ATB FENAC

5.000.000 U.I. / 10.000.000 U.I.

- Antimicrobiano
- Antiinflamatorio
- Analgésico
- Antipirético
- Amplio espectro
- Polvo para preparar
- Acción rápida y de depósito
- Mejor poder bactericida

zoovet

www.zoovet.com.ar

/zoovet.productosveterinarios

@zoovetar

Parque Tecnológico Litoral Centro - Santa fe / Arg.