



## FICHA TÉCNICA

### Actinomicina

#### SECCIÓN 1: información del producto

**Nombre Comercial del Producto:** ACTINOMICINA.

**Clasificación farmacológica:** Antibióticos- Quimioterápicos clásicos y combinados.

**Forma Farmacéutica:** Solución inyectable.

**Especies indicadas:** Bovinos, equinos deportivos, porcinos, caninos, caninos y felinos.

**Vías de administración:** Intramuscular, subcutánea o tópica.

#### SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Estreptomicina Sulfato	25 g
Excipientes c.s.p	100 ml

#### SECCION 3: Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones producidas por microorganismos sensibles a la estreptomicina, como actinomycosis, actinobacilosis, leptospirosis, campilobacteriosis, colibacilosis o diarrea blanca de las primeras semanas, pasteurelisis, infecciones por klebsiellas, haemophilus spp., shigelosis de los potrillos, disentería hemorrágica y diarrea necrótica del cerdo, enteritis no específicas, onfaloflebitis y afecciones producidas por actinomyces spp. El producto actúa en todas las fases de la leptospirosis: aguda, subaguda, crónica o portador en el animal recuperado desde el punto de vista clínico, y en cuanto a la vibriosis genital (causada por campylobacter foetus) es de elección tanto para toros como para vacas.

#### SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Actinomicina

Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.

No ingerir.

No mezclar en la misma jeringa, cánula o envase, con cualquier otra sustancia ajena al producto (otros antibióticos, antiinflamatorios, anestésicos).

En tratamiento prolongados o animales sensibles puede producir ototoxicidad (ataxia, pérdida del equilibrio, sordera) y/o nefrotoxicidad.

**RESTRICCIONES DE USO** Pre-faena: 30 días. Retiro pre-ordeño: No administrar en hembras en lactación. No utilizar en equinos destinados al consumo alimentario humano.

#### SECCION 5: Especificaciones del producto

**Color:** Amarillo - Anaranjado.

**Aspecto:** Solución límpida y cristalina.

#### SECCION 6: Presentaciones

25, 40, 80, 100, 120, 200, 250, 500 ml.

#### SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

#### SECCION 8: Dosis y aplicación

Para todas las especies indicadas en casos no complicados: 10 mg/kg de peso (1 ml/ 25 kg de peso) cada 12 horas, realizando un mínimo de tres aplicaciones, excepto los de actinomicosis y actinobacilosis, que son efectivos con dosis única. Para el tratamiento de leptospirosis en bovinos y porcinos: 25 a 30 mg/kg (1 a 1,2 ml/ 10 kg de peso) cada 24

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Actinomicina

horas y realizando tres aplicaciones. Para el tratamiento de campilobacteriosis en bovinos, se debe utilizar una dosis de 25 a 30 mg/kg ( 1 a 1,2 ml / 10 kg de peso) en dosis única acompañado de tratamiento local: En caso de toros, realizar lavaje prepucial, usando 20 ml de producto (equivalente a 5 g de estreptomina sulfato), masajeando vigorosamente durante un mínimo de 5 minutos. Se puede repetir el tratamiento a los 15 días. En caso de vacas, aplicar tratamiento intrauterino, usando entre 20 y 40 ml de producto (equivalentes a entre 5 y 10 g de estreptomina sulfato) diluido en 50 a 150 ml de solución fisiológica estéril, repitiendo durante tres días.

#### SECCION 9: Conservación

Mantener en lugar fresco y alejado de la luz, entre 15°C y 30°C.

#### SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 05-203
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- El uso de este producto sin un diagnóstico correcto puede generar resistencia a los antimicrobianos. Se deberá respetar la dosis, intervalo y duración del tratamiento.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*