



### SECCIÓN 1: información del producto

**Nombre Comercial del Producto:** ALGITOCINA.

**Clasificación farmacológica:** Antiinflamatorios - Antipiréticos - Analgésicos.

**Forma Farmacéutica:** Solución inyectable.

**Especies indicadas:** Bovinos, equinos y porcinos.

**Vías de administración:** *Bovinos:* Intravenosa lenta. *Equinos y porcinos:* Intramuscular o intravenosa.

### SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Oxitocina	400 UI
Flunixin meglumina	11 g
Vehículos y excipientes c.s.p.	100 ml

### SECCION 3: Indicaciones

Tratamiento coadyuvante en casos de metritis post parto en bovinos, equinos y porcinos.

Tratamiento coadyuvante en mastitis agudas que cursan con agalactia en bovinos y porcinos.

### SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.

Se recomienda combinar con tratamiento antibiótico adecuado toda vez que se sospeche de infección bacteriana como agente causal.

Manipular el producto utilizando guantes de látex.



Se recomienda que el producto no sea manipulado por mujeres embarazadas.

Utilizar con precaución en animales deshidratados (aumenta el riesgo de toxicidad renal por AINEs).

**RESTRICCIONES DE USO:** Tiempo de retiro pre-faena: *Bovinos: 7 días; Porcinos: 21 días.*

No administrar en animales en producción láctea.

No aplicar a equinos destinados a consumo alimentario humano.

### SECCION 5: Especificaciones del producto

**Color:** incoloro a ligeramente amarillento.

**Aspecto:** solución límpida y cristalina.

### SECCION 6: Presentaciones

10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 y 250 ml.

### SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

### SECCION 8: Dosis y aplicación

	VACA	YEGUA	CERDA
<b>Metritis post-parto</b>	1 ml c/50 kg.p.v. c/24 hs. por 3 días consecutivos, vía IV. (1)	1 ml c/100 kg.p.v. c/24 hs. por 3 días consecutivos, vía IM o IV. (2)	5 ml totales c/12 hs. por 2 dosis consecutivas como máximo, vía IM o IV. (3)
<b>Mastitis</b>	5 ml totales, vía IV. Se puede repetir a las 8 horas en caso de no remitir los signos. (1)		5 ml totales c/12 hs por dosis consecutivas como máximo, vía IM o IV. (3)
(1) Equivalentes a 40 UI de Oxitocina y 2,2 mg/kg de Flunixin Meglumine. (2) Equivalentes a 20 UI de Oxitocina y 1,1 mg/kg de Flunixin Meglumine. (3) Equivalentes a 20 UI de Oxitocina y 2,2 mg/kg de Flunixin Meglumine.			

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com





Juntos, más allá de la Salud Animal

## FICHA TÉCNICA

### Algitocina

#### SECCION 9: Conservación

Conservar entre 15°C y 30°C.

#### SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 11-237
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

