



FICHA TÉCNICA

Amoxivet

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: AMOXIVET.

Clasificación farmacológica: Antimicrobiano – Antibiótico – Betalactámico.

Forma Farmacéutica: Suspensión inyectable.

Especies indicadas: Bovinos, ovinos, equinos, porcinos, caninos, felinos y reptiles.

Vías de administración: Exclusivamente por vía intramuscular. Aplicar con aguja de diámetro menor a calibre 20.

SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Amoxicilina	15 g
Excipientes c.s.p	100 ml

SECCION 3: Indicaciones

Antibiótico de acción prolongada, destinado al tratamiento de las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias, urogenitales, tracto digestivo, de la piel y tejidos blandos y de todas las enfermedades producidas por microorganismos sensibles a la Amoxicilina; siendo efectiva, contra un amplio espectro de bacterias Gram-negativas tales como: Pasteurella spp., Brucella spp., Fusobacterium spp., Haemophilus fusiformis, Proteus mirabilis, Salmonella spp., Treponema spp., Moraxella spp.; y Gram-positivas como: Bacillus anthracis, Erysipelotrix spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp. Efectivo en el tratamiento de las siguientes enfermedades: Neumonías, bronconeumonías, pleuroneumonías, erisipela, onfaloflebitis de animales neonatos, gangrena gaseosa, enteroxemias, edema maligno, botulismo, tétanos, carbunco sintomático, pielonefritis, cistitis, pasteurellosis, brucelosis, mastitis, metritis, artritis, procesos purulentonecróticos (locales, diseminados o metastatizantes), salmonelosis,

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Amoxivet

heridas, infecciones post-parto y todas aquellas producidas por patógenos oportunistas y gérmenes sensibles a la amoxicilina. Para la prevención de infecciones post-operatorias mediante administración de la misma antes de la cirugía.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

PRECAUCIONES: El producto utilizado en las dosis indicadas no es tóxico. Ocurren reacciones de hipersensibilidad (especialmente en el ganado bovino), siendo sus manifestaciones comunes reacciones cutáneas, angioedema, fiebre farmacológica, eosinofilia y anafilaxis. En caso de aparición de alguna reacción alérgica, aplicar epinefrina o equivalente.

No administrar a animales alérgicos a las penicilinas. Dada la amplitud del espectro, la acción se desarrolla no solo contra los gérmenes patógenos, sino también contra los que constituyen la flora normal del intestino. El grado de disbacteriosis (alteración del equilibrio de simbiosis bacteriana) depende de la dosis, de la duración del tratamiento, de la composición de la flora intestinal y de su sensibilidad. El producto debe manejarse con las normas de asepsia corrientes para todos los inyectables. No debe ser administrado por vía endovenosa.

RESTRICCIONES DE USO: Discontinuar el tratamiento 25 días prefaena. No destinar a consumo humano la leche proveniente de los animales durante el tratamiento y hasta 72 hs luego de la última administración.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Blanco a ligeramente amarillento.

Aspecto: suspensión homogénea.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Amoxivet

SECCION 6: Presentaciones

100 ml.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

La dosis por administrar es de 15 mg/kg, equivalente a 1 ml del producto por cada 10 kg de peso para todas las especies y edades. Según el caso a tratar puede repetirse la dosis a las 48 hs, supeditado al criterio del médico veterinario. Cuando la dosis a administrar supere los 10 ml en ovinos y porcinos y los 15 ml en bovinos y equinos, se recomienda subdividirla en 2 o 3 puntos de inoculación.

SECCION 9: Conservación

Entre 15°C y 25°C evitando la exposición a la luz y la acción de los rayos solares.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 03-067
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- El uso de este producto sin un diagnóstico correcto, puede generar resistencia a los antimicrobianos. Se deberá respetar la dosis, intervalo y duración del tratamiento.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal