Juntos, más allá de la Salud Animal

FICHA TÉCNICA

Ciclar

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: CICLAR

Clasificación farmacológica: Medicamento para el aparato reproductor y manejo de la reproducción. Hormonal - Prostaglandina/sintética

Forma Farmacéutica: Solución inyectable.

Especies indicadas: Bovinos.

Vías de administración: Intramuscular.

SECCIÓN 2: Composición

Componente	*Cantidad*
D+Cloprostenol (D+Cloprostenol sódico 0,0079 g)	0,0075 g
Excipientes c.s.p	100 ml

SECCION 3: Indicaciones

Sincronización del celo: Por tratarse de un agente luteolítico provoca la regresión morfológica y funcional del cuerpo lúteo. De este modo se consigue que los animales manifiesten el celo, y ovulen entre los 2 a 5 días posteriores al tratamiento.

Desórdenes funcionales del ciclo estral.

Desórdenes funcionales de los ovarios (quistes foliculares o luteales).

Patologías uterinas post parto (piómetras, endometritis crónicas).

El cloprostenol es útil en el tratamiento de un útero infectado. Es probable que el mecanismo de acción se deba a dos efectos: Primero, por la involución del cuerpo lúteo, si está presente, con la consecuente inducción del crecimiento folicular y producción de estrógenos; segundo, por la contracción del útero tanto por una acción directa, como a la acción de los estrógenos.

Camila O'Gorman 412, Piso 12º
Puerto Madero - C1107DED
Buenos Aires - Argentina
Tel: (54 11) 3724 7700
info.argentina@ceva.com

reprodAction

Interrupción de la gestación no deseada: El cloprostenol puede ser utilizado como abortivo, pero sólo en el primer tercio de la gestación.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

- Verificar que el animal al que se desea administrar cloprostenol no este preñado, a menos que el objetivo sea terminar con la preñez.
- No administrar en cerdas antes de los 3 días previos al parto.
- Las mujeres embarazadas y las personas con predisposición asmática no deben manipular el producto, puesto que puede provocar abortos o episodios de broncoespasmo.
- Los efectos colaterales que pueden presentarse son, en bovinos: Incremento de la temperatura corporal y salivación. En porcinos: Eritema, prurito, ligera incoordinación, rascado y espasmo de la musculatura abdominal.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: incoloro

Aspecto: solución límpida y cristalina.

Densidad: entre 0,970 g/ml – 1,020g/ml

pH: 5,8 – 6,2

SECCION 6: Presentaciones

2 ml: frasco de vidrio ámbar, con cierre inviolable. Flip off color celeste. Etiqueta identificadora impresa. Caja de cartón impresa. Prospecto adjunto. 10 unidades por caja.

20 ml: frasco de vidrio ámbar, con cierre inviolable. Flip off color celeste. Etiqueta identificadora impresa. Caja de cartón impresa.

50 ml: frasco de vidrio ámbar, con cierre inviolable. Flip off color celeste. Etiqueta identificadora impresa. Caja de cartón impresa.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

- Bovinos: 2 ml (0,150 mg). Porcinos: 1 ml (0,075 mg).
- Ovinos: 0,5 ml (0,0375 mg). En todos los casos se aplica en dosis única.

Para sincronización del celo se puede utilizar alguno de los siguientes esquemas: En el caso de aplicar el esquema de sincronización ciega a tiempo fijo, se aplica cloprostenol a todos los animales con un intervalo de 11 días entre las aplicaciones y se inseminan todos los individuos entre 72 y 96 horas después de la segunda inyección. Otra alterativa es detectar celo e inseminar después de la primera aplicación; aquellos animales que no manifiesten celo recibirán una segunda inyección a los 11 días del primer tratamiento y se inseminarán luego de la manifestación de celo.

SECCION 9: Conservación

Conservar en lugar fresco y seco al abrigo de la luz solar directa entre 15ºC y 30ºC.

SECCION 10: Información adicional

- Especies indicadas: hembras bovinas, Ovinas y Porcinas.
- Tiempo de retiro pre-faena: 0 horas.
- Tiempo de descarte en leche: 0 horas.
- No derramar el contenido de los frascos o desechar éstos en caudales de agua, lagunas, etc.

- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.

Camila O'Gorman 412, Piso 12º
Puerto Madero - C1107DED
Buenos Aires - Argentina
Tel: (54 11) 3724 7700
info.argentina@ceva.com