



FICHA TÉCNICA

Cloxampi M.A.

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: CLOXAMPI M.A.

Clasificación farmacológica: Antimicrobiano - Antibiótico - Betalactámico Penicilínico.

Forma Farmacéutica: Pomada de uso intramamario.

Especies indicadas: Bovinos.

Vías de administración: Intramamaria.

SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Cada inyector contiene:	
Ampicilina Sódica	75 mg
Cloxacilina Sódica	200 mg
Excipientes c.s.p	4,5 g

SECCION 3: Indicaciones

Para el tratamiento de mastitis agudas, producidas por bacterias Gram positivas y Gram negativas. Agentes susceptibles: Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Aerobacter spp., Corynebacterium pyogenes, Pseudomonas spp.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

PRECAUCIONES: El producto está contraindicado en animales sensibles a cualquiera de los principios activos.

No administrar junto con penicilina.

RESTRICCIONES DE USO: Discontinuar el tratamiento 14 días antes de la faena del animal para consumo humano.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Cloxampi M.A.

Deberán transcurrir 48 horas entre la aplicación del producto y el destino de la leche (con o sin manufactura previa) para consumo humano.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Blanco.

Aspecto: Consistencia semisólida.

SECCION 6: Presentaciones

Cajas conteniendo 36 jeringas, y baldes de plástico con etiqueta, conteniendo 180 jeringas.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

Bovinos: Una jeringa por cuarto afectado cada 12 horas, durante 3 días consecutivos. Extraer en lo posible la totalidad de la leche de la ubre afectada y lavar con agua tibia y un desinfectante. Secar cuidadosamente y topicar cada pezón con un algodón embebido en un antiséptico. Introducir el contenido completo de una jeringa a través del conducto galactóforo. A fin de favorecer la difusión del producto, es conveniente dar un ligero masaje ascendente. Al terminar el tratamiento se recomienda el sellado de los pezones. Las personas que realicen los tratamientos deben lavar y secar sus manos luego de cada tratamiento.

SECCION 9: Conservación

El producto debe ser conservado entre 15°C y 25°C al resguardo de la luz solar.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 03-229
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Respetar normas de asepsia.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal