



## FICHA TÉCNICA

### Duo Dexa Fenac

#### SECCIÓN 1: información del producto

**Nombre Comercial del Producto:** DUO DEXA FENAC.

**Clasificación farmacológica:** Antiinflamatorio no esteroide – Analgésico – Antipirético.

**Forma Farmacéutica:** Solución inyectable.

**Especies indicadas:** Bovinos, ovinos, porcinos y equinos.

**Vías de administración:** Intramuscular profunda.

#### SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Dexametasona fosfato sódica	0,2 g
Diclofenac sódico	5,0 g
Excipientes c.s.p.	100,0 ml

#### SECCION 3: Indicaciones

Se indica para todas aquellas patologías en las cuales exista un componente inflamatorio, doloroso o hipertermia, por ejemplo:

En bovinos y ovinos: Patologías inflamatorias podales o respiratorias, metritis post parto, mastitis aguda o hiperaguda, prevención y tratamiento del dolor post quirúrgico.

En equinos: Artritis, bursitis, tendinitis, mialgias, como antipirético junto a tratamiento antibiótico en procesos infecciosos.

En porcinos: Procesos inflamatorios pulmonares, podales y enteritis.

#### SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

No debe utilizarse en hembras en gestación, diabetes mellitus, gastritis y/o úlceras gastrointestinales, insuficiencia hepática, renal o cardíaca, enfermedades infecciosas (como tratamiento único).

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Duo Dexa Fenac

No utilizar en hembras en lactancia.

Las dosis elevadas de corticosteroides por períodos prolongados conducen casi invariablemente a la supresión del eje hipotálamo hipofisario, con el consecuente Síndrome de Cushing.

El uso terapéutico de los corticoides origina dos clases de efectos tóxicos: Los que sobrevienen por supresión del tratamiento esteroide. Los que aparecen por el uso continuado de dosis supra fisiológicas.

La complicación más grave por el cese de esteroides es la insuficiencia suprarrenal aguda. El uso crónico puede provocar anomalías de líquidos y electrolitos, hipertensión, incremento de la sensibilidad a la infección, osteoporosis, miopatías, alteraciones de conducta, cataratas, interrupción del crecimiento, así como los signos característicos de redistribución de los panículos adiposos, equimosis e hirsutismo.

Precauciones que deben tomarse antes, durante y luego de su utilización: Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.

#### **RESTRICCIONES DE USO:**

Tiempo de retiro pre-faena: Bovinos y ovinos: 6 días. Porcinos: 5 días.

No utilizar en hembras en ordeño.

No utilizar en equinos destinados al consumo humano.

#### **SECCION 5: Especificaciones del producto**

**Color:** Incoloro a ligeramente amarillento.

**Aspecto:** Solución líquida y cristalina.

**Camila O'Gorman 412, Piso 12°**

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Duo Dexa Fenac

#### SECCION 6: Presentaciones

5, 10, 20, 50 y 100 ml.

#### SECCION 7: Periodo de validez

3 años a partir de la fecha de elaboración.

#### SECCION 8: Dosis y aplicación

Todas las especies: 1 ml cada 20 kg de peso (equivalentes a 0,1mg/kg de dexametasona fosfato sódico y 2,5 mg/kg de diclofenac sódico).

Intervalo entre dosis: Repetir cada 24 hs.

Duración del tratamiento: Se recomiendan de una a tres dosis, sin embargo la duración del tratamiento depende del tipo de patología a tratar y del criterio del profesional veterinario actuante.

#### SECCION 9: Conservación

Entre 15°C y 30°C y al abrigo de la luz solar directa.

#### SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 09-029
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*