



## FICHA TÉCNICA

### Ecto 2A Plus

#### SECCIÓN 1: información del producto

**Nombre Comercial del Producto:** ECTO 2A PLUS.

**Clasificación farmacológica:** Antiparasitarios externos.

**Forma Farmacéutica:** Solución.

**Especies indicadas:** Bovinos, porcinos y equinos.

**Vías de administración:** Se aplica por aspersion, sobre el cuerpo del animal, previa dilución.

#### SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Clorpirifos	41,6 g
Cipermetrina	16 g
Excipientes c.s.p	100 ml

#### SECCION 3: Indicaciones

El producto presenta efectividad contra las siguientes familias de insectos: Muscidae, Culicidae y Tabanidae.

#### SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

**CONTRAINDICACIONES:** No utilizar en animales flacos, enfermos o con problemas hepáticos. No utilizar con otros principios activos organofosforados o carbamatos.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:** Mantener en su envase original. Guardar bajo llave. Peligrosa su ingestión, aspiración y contacto con la piel. Producto moderadamente tóxico, no ingiera alimentos ni fume durante su manipulación. No almacenar o transportar junto a los alimentos. Use vestimenta adecuada (Guantes de goma, delantal plástico y gafas de seguridad). No pulverizar contra el viento. Lavarse con abundante agua y jabón luego de

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Ecto 2A Plus

manipular el producto. No derramar el contenido de los frascos o desechar éstos en cauces de agua, lagunas, etc.

El producto no está indicado para su uso en Medicina Humana. La intoxicación puede producirse por manipulación incorrecta del producto. Síntomas de intoxicación: mareos, náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, lagrimeo y salivación abundante, pulso lento, convulsiones, dificultad respiratoria, coma y muerte. Si existe malestar concurrir al médico. Utilizar dentro de las 24h de su preparación. Antídotos: Atropina: 2 a 4 mg, por vía endovenosa si es posible o bien por vía intramuscular. Han de aplicarse 2 mg cada 10 a 15 minutos hasta que desaparezcan los síntomas muscarínicos que hubieren reaparecido. Pralidoxima: 1 a 2 g en solución endovenosa administrada en plazo no menor de cinco minutos. La dosis podrá repetirse si la debilidad no se elimina o si reaparece después de 20 a 60 minutos.

**RESTRICCIONES DE USO:** No utilizar en equinos destinados al consumo humano. Deben transcurrir 14 días entre su uso y la faena para consumo humano. No usar en vacas lecheras en lactación.

#### SECCION 5: Especificaciones del producto

**Color:** Amarillo – Amarillo oscuro.

**Aspecto:** Solución límpida y cristalina.

#### SECCION 6: Presentaciones

50, 100, 200, 500 y 1000 ml.

#### SECCION 7: Periodo de validez

3 años a partir de la fecha de elaboración.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Ecto 2A Plus

#### SECCION 8: Dosis y aplicación

Se aplica por aspersión, sobre el cuerpo del animal, previa dilución a razón de 200 ml de ECTO 2A Plus por cada 200 litros de agua, mediante bomba aspersora manual o mecánica. Puede aplicarse en salas de ordeño, establos, porquerizas, parideras, tanto en pisos como en paredes, en forma uniforme mediante bomba aspersora manual o mecánica. La cantidad de producto diluido a utilizar por animal es la siguiente: Bovinos y equinos adultos: 1 a 3 litros/animal (dependiendo del tamaño del animal y la carga parasitaria). Porcinos: 1 a 2 litros/animal (dependiendo del tamaño del animal y la carga parasitaria). Se puede repetir a los 15 a 30 días dependiendo de la carga de insectos presente.

#### SECCION 9: Conservación

Conservar entre 15 °C y 30 °C y al abrigo de la luz solar directa.

#### SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 09-122
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*