



SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: EDEMAX.

Clasificación farmacológica: Diurético antiinflamatorio esteroide.

Forma Farmacéutica: Solución inyectable.

Especies indicadas: Bovinos, ovinos y equinos.

Vías de administración: Intramuscular.

SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Cada 100 ml contiene	
Dexametasona Fosfato Sódico	0,06 g
Triclorometiazida	1,00 g
Exipientes c.s.p.	100 ml

SECCION 3: Indicaciones

Bovinos y ovinos: congestión y edema de ubre. Persistencia del edema de lactación. Edema y congestión pulmonar. Edema de manifestaciones alérgicas. Infiltración edematosa de heridas quirúrgicas.

Equinos: Congestión y edema de origen diverso. Edema de declive. Edema de manifestaciones alérgicas. Infiltración edematosa de heridas quirúrgicas.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

No debe utilizarse en casos de glomerulonefritis aguda e insuficiencia renal, y en pacientes con cirrosis hepática grave. Tampoco se recomienda la administración en casos de pancreatitis y diabetes mellitus.

No administrar en hembras preñadas.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Edemax

Como todos los diuréticos mayores, tratamientos prolongados o sobredosis pueden producir alteraciones del equilibrio electrolítico. Se aconseja no sobrepasar las dosis indicadas y no aplicar tratamientos que superen en duración a los 3 días, esperando una semana si se desea repetir.

No es conveniente su administración en enfermedades infecciosas bacterianas, virales y micóticas y sarna demodéctica.

A la dosis recomendada es bien tolerado.

No derramar el contenido de los frascos o desechar éstos en cauces de agua, lagunas, etc.

PERÍODO DE RETIRO: No destinar animales a faena ni destinar la leche de los mismos a consumo humano hasta 72 horas después de finalizado el tratamiento.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Incoloro - Amarillento.

Aspecto: Solución líquida y cristalina.

SECCION 6: Presentaciones

15 y 30 ml.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

La dosis general es de 0,5 ml cada 20 kg de peso vivo. Equivalente a Dexametasona: 0,015 mg/kg, Triclorometiazida: 0,25 mg/kg. Esta dosis puede repetirse a las 24 horas, dependiendo de la evolución del caso clínico y del criterio del profesional actuante.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



En edema de ubre, administrar 10 a 20 ml, repitiendo el tratamiento a las 24 horas, en caso de ser necesario.

SECCION 9: Conservación

Conservar entre 15°C y 30°C y al abrigo de la luz solar directa.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 03-222
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal