



FICHA TÉCNICA

Injection I.

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: INJECTION I.

Clasificación farmacológica: Antiparasitario interno y externo.

Forma Farmacéutica: Solución inyectable.

Especies indicadas: Bovino, porcinos y camélidos.

Vías de administración: Subcutánea.

SECCIÓN 2: Composición

Componente	Cantidad
Cada 100 ml contiene:	
Ivermectina	1 g
Excipiente c.s.p	100 ml

SECCION 3: Indicaciones

En *bovinos*:

Parásitos gastrointestinales: *Bunostomum phlebotomum* (adultos, L3 y L4), *Cooperia oncophora* (adultos y L4), *Cooperia pectinata* (adultos y L4), *Cooperia punctata* (adultos y L4), *Cooperia* spp. (adultos y L3), *Haemonchus placei* (adultos, L3 y L4), *Mecistocirrus digitatus* (adultos), *Nematodirus helvetianus* (adultos), *Nematodirus spathiger* (adultos), *Oesophagostomum radiatum* (adultos, L3 y L4), *Ostertagia lyrata* (adultos y L4), *Ostertagia ostertagi* (adultos, L3 y L4, incluyendo larvas inhibidas), *strongyloides papillosus* (adulto), *Trichostrongylus axei* (adultos y L4), *Trichostrongylus colubriformis* (adultos y L4), *Toxocara vitulorum* (adultos).

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (adultos, L4 y larvas inhibidas).

Ectoparásitos: Sarna; Acariosis cutánea producida por: *Psoroptes communis* var. *bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Chorioptes bovis*.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Injection I.

Piojos chupadores: Haematophinus eurysternus, Linognatus vituli, Solenopotes capillatus.

Miasis.Ura: Dermatobia hominis.

Otras: Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum. Miasis del ombligo y castración.

Piojos masticadores: Ayuda en el control de Bovícola bovis. Otros parásitos sobre los que la Ivermectina ha demostrado acción terapéutica: Parafilaria bovícola (adultos), Thelazia spp. (adultos), Crysomya bezziana.

En *porcinos*:

Parásitos gastrointestinales: Ascaris suum (adultos y L4), Hyostrongylus rubidus (adultos y L4), Oesophagostomum spp. (adultos y L4), Strongyloides ransomi (adultos), Trichuris suis (adultos).

Parásitos pulmonares: Metastrongylus spp. (adultos).

Parásito del riñón: Stephanurus dentatus (adultos y L4).

Ectoparásitos: Sarna: Acariosis cutánea producida por Sarcoptes scabiei var. suis.

Piojos: Haematopinus suis.

En *camélidos*:

Parásitos gastrointestinales: Nemátodos: Camelostomylus spp., Ostertagia spp., Haemonchus spp., Cooperia spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Impalaia spp., Strongyloides spp., Oesophagostomum spp., Chabertia ovina, Trichuris spp., Cephalopina titillator.

Ectoparásitos: Sarna: Sarcoptes scabiei var. auchinae, Chorioptes bovis, Psoroptes spp.

Piojos: Microthoracius spp., Bovicola breviceps.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

RESTRICCIONES DE USO: No administrar en vacas lecheras en producción. No administrar en vacas dentro de los 28 días previos al parto. No sacrificar animales bovinos destinados

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Injection I.

a consumo humano hasta que hayan transcurrido 35 días desde el último tratamiento. En el caso particular de los porcinos este período es de 18 días.

PRECAUCIONES: En dosis mayores a 10 ml se recomienda dividirla y aplicar en dos puntos diferentes. Utilizar material estéril y seguir procedimientos asépticos. No aplicar por ninguna otra vía que no sea la subcutánea. En el caso que se aplique accidentalmente por vía endovenosa pueden aparecer temblores, convulsiones y coma. Deberá prescribirse un tratamiento sintomático. No hay antídoto específico. Lavarse las manos luego de su utilización. No comer, beber o fumar durante su manejo.

SEGURIDAD: En los animales: A las dosis terapéuticas indicadas puede emplearse en hembras gestantes.

En dosis mayores a 10 ml se recomienda dividirla y aplicar en dos puntos diferentes.

Pueden aparecer reacciones locales con o sin dolor en el punto de inoculación, que desaparecen en poco tiempo.

El producto posee un amplio margen de seguridad, pero en ciertos casos de intoxicación pueden presentarse temblores, convulsiones y coma. Deberá prescribirse un tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.

En el hombre: En caso de inoculación accidental llamar al médico. Deberá prescribirse un tratamiento sintomático. No hay antídoto específico. Evitar el contacto con los ojos; en caso de producirse lavar con abundante agua y consultar al médico.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Incolora.

Aspecto: Solución límpida y cristalina.

SECCION 6: Presentaciones

50, 100 y 500ml.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Injection I.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

Bovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo (equivalente a 200 µg de Ivermectina por kg de peso vivo). Aplicar por vía subcutánea en la tabla del cuello o por delante o por detrás de la paleta empleando aguja 10/18 y equipo estéril.

Tabla de dosificación en bovinos:

Hasta 50 kg	1 ml	301 - 350 kg	7 ml
51 - 100 kg	2 ml	351 - 400 kg	8 ml
101 - 150 kg	3 ml	401 - 450 kg	9 ml
151 - 200 kg	4 ml	451 - 500 kg	10 ml
201 - 250 kg	5 ml	501 - 550 kg	11 ml
251 - 300 kg	6 ml	551 - 600 kg	12 ml

Para el tratamiento y control de los parásitos internos de los bovinos es recomendable desarrollar un plan estratégico con asesoramiento veterinario, debiéndose tener en cuenta la categoría de los animales, el tipo y la antigüedad de las pasturas y los antecedentes del potrero respecto del desafío parasitario al que aquellos pudieran estar expuestos, así como también las condiciones ambientales imperantes.

Se recomienda además realizar periódicamente controles coproparasitológicos por recuentos de h.p.g de un lote perfectamente identificado con pesadas simultáneas.

Porcinos: 1 ml cada 33 kg de peso vivo (equivalente a 300 µg/kg de peso vivo) por vía subcutánea en la piel laxa detrás de la oreja o en la ingle (cara interna del muslo) empleando agujas estériles 12/6 y según la siguiente tabla:

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Injection I.

16 kg	0.5 ml	133 kg	4 ml
33 kg	1 ml	166 kg	5 ml
66 kg	2 ml	200 kg	6 ml
100 kg	3 ml		

Superando los 200 kg de peso vivo aplicar a razón de 1 ml cada 33 kg de peso vivo.

En cerdos: Recomendaciones de uso

Lechones: A la semana de vida y al destete.

Cachorras 1ª parición: 7 a 14 días antes del servicio y de 7 a 14 días antes del parto.

Cerdas: 7 a 14 días antes del parto.

Padrillos: Al menos 2 veces al año.

Capones: Al entrar en pista o sea al comienzo del engorde.

Camélidos: 1ml cada 50 kg de peso vivo (equivalente a 200 µg/kg).

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO E INTERVALO ENTRE DOSIS: Dependiendo de las categorías y del riesgo parasitario y/o según criterio del Médico Veterinario asesor.

Prevención de las miasis: De ombligo: Aplicar una dosis en las primeras 24 horas de nacimiento; de la castración: Simultáneamente con esta práctica.

Camélidos: Para tratamiento de ectoparasitosis: Aplicar 2 dosis, separadas por un intervalo de 7 días. Para tratamiento de endoparásitos: Dosis única.

RECOMENDACIÓN: EN AMBAS ESPECIES DOMÉSTICAS Y PARA EL CONTROL DE PIOJOS CHUPADORES SE RECOMIENDA REPETIR EL TRATAMIENTO CON UN INTERVALO DE 17 - 21 DÍAS.

Camila O'Gorman 412, Piso 12º

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Injection I.

SECCION 9: Conservación

Conservar en su envase original entre 15°C y 30°C y al abrigo de la luz

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 04-194
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal