



FICHA TÉCNICA

Linco 300

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: LINCO 300.

Clasificación farmacológica: Antibióticos, Quimioterápicos clásicos y combinados.

Forma Farmacéutica: Solución inyectable.

Especies indicadas: Bovinos, porcinos, caninos y felinos.

Vías de administración: Intramuscular.

SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Lincomicina (como Clorhidrato)	30 g
Excipientes c.s.p	100 ml

SECCION 3: Indicaciones

Linco 300 está indicada en infecciones por gérmenes grampositivos del tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, huesos y articulaciones.

En el caso particular de los bovinos está especialmente indicada para el tratamiento de mastitis causadas por *Staphylococcus* spp. y *Streptococcus* spp.

En porcinos está especialmente indicada para el tratamiento de Neumonías causadas por *Mycoplasma* spp.; artritis causadas por *Mycoplasma* spp., *Staphylococcus* spp. *Streptococcus* spp. y *Erysipelothrix* spp. y disentería porcina causada por *Serpulina* (*Treponema*) *hyodysenteriae*.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

No administrar a equinos, conejos, hámsters, cobayos debido a los serios efectos gastrointestinales que pueden presentarse, incluida la muerte.

No administrar en animales hipersensibles al principio activo.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Linco 300

Las inyecciones intramusculares pueden inducir dolor en el sitio de aplicación. Los efectos adversos comunicados en caninos y felinos incluyen gastroenteritis (emesis, deposiciones blandas, y pocas veces diarreas sanguinolentas).

Los cerdos y los bovinos también pueden experimentar anomalías gastrointestinales mientras reciben la medicación.

RESTRICCIONES DE USO: Deben transcurrir 14 días entre el último día del tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano. Deben transcurrir 48 horas entre el último día de tratamiento y el destino de la leche para consumo humano. El producto no está indicado para su uso en Medicina Humana.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Incoloro - amarillento.

Aspecto: Solución límpida y cristalina.

SECCION 6: Presentaciones

100 ml.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

Porcinos: 15 mg/kg (1 ml cada 20 kg de peso vivo).

Bovinos: 5 a 10 mg/kg (1 a 2 ml cada 60 kg de peso vivo).

Caninos y felinos: 22 mg/kg (1 ml cada 13,5 kg de peso vivo).

Intervalo entre dosis: Repetir cada 24 horas.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Linco 300

Duración del tratamiento: Porcinos, caninos y felinos: 3 a 7 días, según la severidad del cuadro clínico y el criterio del profesional actuante. Bovinos: 3 a 4 días, según la severidad del cuadro clínico y el criterio del profesional actuante

SECCION 9: Conservación

Entre 15°C y 30°C, al resguardo de la luz solar directa.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 11-165
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal