



## FICHA TÉCNICA

### Oxifenac L.A.

#### SECCIÓN 1: información del producto

**Nombre Comercial del Producto:** OXIFENAC L.A.

**Clasificación farmacológica:** Antimicrobiano - Antibiótico - Tetraciclina - Tratamiento de la inflamación - Antiinflamatorio no Esteroide.

**Forma Farmacéutica:** Solución inyectable.

**Especies indicadas:** Bovinos y porcinos.

**Vías de administración:** Intramuscular profunda.

#### SECCIÓN 2: Composición

<i>Cada 100 ml contiene:</i>	
Oxitetraciclina clorhidrato	20,0 % (p/v)
Diclofenac sódico	2,5 % (p/v)
Agua de ósmosis c.s.p	100,0 ml

#### SECCION 3: Indicaciones

OXIFENAC LA es un antibiótico de amplio espectro y larga acción, antiinflamatorio, analgésico y antipirético. OXIFENAC LA está indicado contra un amplio rango de enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la Oxitetraciclina. Está indicado para el tratamiento y control de: Actinobacilosis, Anaplasmosis, Carbunco sintomático, Onfaloflebitis, Diarrea de los terneros, Enteritis bacteriana, Erisipela, Fiebre del transporte (asociada con *Pasteurella* spp. y *Haemophilus* spp.), Infecciones inespecíficas causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas, Infecciones post parto (metritis) y postquirúrgicas, Leptospirosis, Mastitis, Pietin, Queratoconjuntivitis (causada por *Moraxella bovis*), Neumonía, Bronquitis.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Oxifenac L.A.

Actúa sobre: Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Moraxella bovis, Clostridium spp., Bacillus Anthracis, Brucella spp., Haemophilus spp., Escherichia coli, Bordetella spp., Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Pasteurella spp., Borrelia spp., Leptospira icterohaemorrhagiae, Actinomyces israelii, Rickettsia prowazekii, Rickettsia typhi, Anaplasma spp., Ehrlichia canis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis.

#### SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

**CONTRAINDICACIONES:** No administrar en animales hipersensibles al principio activo. Debido a que ejerce influencia negativa sobre la inmunización con vacunas vivas, se sugiere no administrar a lechones en días previos a la vacunación contra salmonellosis. Dada la amplitud del espectro, la acción se desarrolla no sólo contra los gérmenes patógenos, sino también contra los que constituyen la flora normal del intestino.

Afecta a la flora de la panza de los bovinos jóvenes. Reduce el contenido bacteriano, sobre todo los bacilos y cocos Gram positivos. No administrar por la vía intravenosa. Ocasionalmente puede observarse en el lugar de la inyección una ligera reacción pasajera. Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal. Su utilización en hembras gestantes puede inducir coloración anormal en las piezas dentarias del neonato. No administrar a hembras en término de preñez, debido a que puede provocar inercia uterina. No utilizar en insuficiencia renal o hepática.

**RESTRICCIONES:** En animales destinados a consumo humano, se deberá suspender el tratamiento 28 días antes del sacrificio. No administrar en animales productores de leche para consumo humano o su industrialización.

#### SECCION 5: Especificaciones del producto

**Color:** Ámbar.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Oxifenac L.A.

**Aspecto:** Solución límpida y cristalina.

#### SECCION 6: Presentaciones

25, 50, 100, 250, 500 ml.

#### SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

#### SECCION 8: Dosis y aplicación

1 ml cada 10 kg de peso. (Correspondientes a 20 mg/kg de oxitetraciclina clorhidrato y 2,5 mg/kg de diclofenac sódico).

Intervalo entre dosis: Puede repetirse a los 3 a 4 días.

Duración del tratamiento: Se recomienda un mínimo de dos aplicaciones. La duración del tratamiento depende del tipo de patología a tratar y del criterio del profesional actuante.

No aplicar más de 10 ml por punto de inyección en bovinos y no más de 5 ml en porcinos.

#### SECCION 9: Conservación

Conservar entre 15°C y 30°C al abrigo de la luz solar directa..

#### SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 05-080
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Oxifenac L.A.

- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- El uso de este producto sin un diagnóstico correcto puede generar resistencia a los antimicrobianos. Se deberá respetar la dosis, intervalo y duración del tratamiento.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

**Camila O'Gorman 412, Piso 12°**

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*