



FICHA TÉCNICA

Oxisol L.A. Zoovet

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: OXISOL L.A. ZOOVET

Clasificación farmacológica: Antibiótico de amplio espectro y acción prolongada.

Forma Farmacéutica: Solución inyectable.

Especies indicadas: Bovinos, ovinos y porcinos.

Vías de administración: Intramuscular profunda. En lechones se recomienda la vía subcutánea.

SECCIÓN 2: Composición

<i>Cada 100 ml contiene:</i>	
Oxitetraciclina clorhidrato	20,0 % (p/v)
Excipientes c.s.p	100,0 ml

SECCION 3: Indicaciones

Tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas producidas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina en bovinos, ovinos y porcinos.

Especies de microorganismos comúnmente sensibles a la Oxitetraciclina: Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Moraxella bovis, Clostridium spp., Bacillus anthracis, Brucella spp., Haemophilus spp., Escherichia coli, Bordetella spp., Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Pasteurella spp., Borrelia spp., Leptospira icterohaemorrhagiae, Actinomyces israelii, Rickettsia prowazekii, Rickettsia typhi, Anaplasma spp., Ehrlichia canis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis. Algunos ejemplos de patologías causadas por estos gérmenes en las especies indicadas son: Bovinos y ovinos: Anaplasmosis y otras rickettsiosis, neumonías, mancha y gangrena, carbunco bacteridiano, listeriosis, queratoconjuntivitis infecciosa, leptospirosis, brucelosis,

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



actinomicosis, mastitis, clamidiasis. Porcinos: Rinitis atrófica, enfermedades respiratorias bajas causadas por *Mycoplasma* spp., *Pasteurella multocida* y/o *Haemophilus pleuropneumoniae*, leptospirosis, linfadenitis estreptocócica.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

No administrar en animales hipersensibles al principio activo.

No administrar en hembras gestantes.

No administrar en insuficiencia renal y/o hepática.

No administrar en animales lecheros en producción.

No administrar por vía endovenosa.

No exceder las dosis propuestas.

RESTRICCIONES: Periodo de retiro pre-faena: 28 días.

Periodo de retiro pre-ordeño: No aplicar en animales en producción lechera.

INTOXICACIÓN Y SOBREDOSIS EN LOS ANIMALES: Puede ocurrir hepatotoxicidad en animales tratados con oxitetraciclina cuando ésta es administrada en dosis excesivas o durante períodos muy prolongados, o bien si existe alguna causa que impida la eliminación normal de la droga del organismo (ej: insuficiencia renal). Ciertos disturbios gastrointestinales pueden ocurrir a consecuencia de disbacteriosis luego de tratamientos prolongados. En casos excepcionales, se han reportado casos de fotosensibilización en animales tratados con tetraciclinas. En todos los casos mencionados, el tratamiento consiste en la suspensión de la administración y sostén sintomático del paciente.

ATENCIÓN: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

En caso de ingestión accidental los síntomas más comunes son los de la toxicidad hepática y gastrointestinal (náuseas, vómitos, diarrea, etc.), pudiendo más tarde aparecer fenómenos de pigmentación amarillenta de dientes (y huesos), alteración en la formación del esmalte de los dientes, detención del crecimiento en infantes y leve pérdida de peso (por la



FICHA TÉCNICA

Oxisol L.A. Zoovet

inhibición de la síntesis proteica). LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO. Se debe realizar tratamiento sintomático, pudiéndose administrar compuestos protectores de la mucosa gástrica que contenga aluminio, para provocar quelación de la droga.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Ámbar.

Aspecto: Solución límpida y cristalina.

SECCION 6: Presentaciones

50, 250, 500 ml.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

20 mg/kg (1 ml cada 10 kg de peso). Volúmenes máximos por inyectar por punto de inoculación: Bovinos: 20 ml; Porcinos: 5ml; Ovinos: 5 ml. Intervalo entre dosis: 48 a 96 hs. Duración del tratamiento: Se recomienda un mínimo de dos aplicaciones.

SECCION 9: Conservación

Al resguardo de la luz solar directa, entre 15°C y 35°C.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 04-079
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Oxisol L.A. Zoovet

- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal